

Обложка
щется

Обложка
щется

Вѣстникъ Опытной Физики

и

Элементарной Математики.



№ 663.



Содержание: Введение въ учение объ основаніяхъ геометріи. *Прив.-доц. В. Ф. Кагана.* (Продолженіе). — Природа взрывчатыхъ веществъ. *А. Маршалля.* — Приемъ Эрмита при разложеніи числа на сумму двухъ квадратовъ. *И. Чирева.* — Изъ записной книжки преподавателя. «Къ вопросу объ опредѣленіи понятія „аксіома“». *И. Дуба.* — Полемика. «Отвѣтъ на замѣтку г. А. Арндта, помѣщенную въ № 655 — 656 „Вѣстника“». *И. Александрова.* — Задачи №№ 347 — 350 (6 сер.). — Рѣшенія задачъ №№ 308 и 309 (6 сер.). — Книги и брошюры, поступившія въ редакцію. — Объявленія.

Введение въ учение объ основаніяхъ геометріи.

Прив.-доц. В. Ф. Кагана.

(Продолженіе *).

II. УЧЕНИЕ О ВЕЛИЧИНѢ.

§ 2. Основныя свойства понятій „равно“, „больше“ и „меньше“.

1. Что такое величина? Почти во всѣхъ руководствахъ по ариметикѣ мы находимъ слѣдующее опредѣленіе: „величина есть все то, что можетъ быть больше или меньше“. Это опредѣленіе можно найти даже въ знаменитой книжкѣ, которая многими признается первымъ дѣйствительно научнымъ сочиненіемъ по ариметикѣ, — въ „Учебникѣ ариметики“ Германа Грассмана**).

Но что же такое „равно“, „больше“, „меньше“? Если мы станемъ перебирать всѣ тѣ многообразные случаи, когда мы эти термины употребляемъ, то врядъ ли мы найдемъ что-либо наглядно общее во всѣхъ

*) См. „Вѣстникъ“, № 662.

**) H. Grassmann — „Lehrbuch der Arithmetik“, 1861. Грассманъ, впрочемъ, говоритъ такъ: „Величина есть всякая вещь, которая можетъ быть признана равной или неравной другой вещи“.

тѣхъ различныхъ представленійхъ и образахъ, которые мы съ этими понятіями соединяемъ. Мы не будемъ обсуждать здѣсь вопроса о томъ, есть ли что-либо общее въ тѣхъ образахъ, которые намъ рисуются, когда мы говоримъ о большей или меньшей длинѣ, о большей или меньшей плотности, температурѣ, бѣлизнѣ, красотѣ и т. д.; это дѣло психологовъ. Для насъ существенно важно не то. Въ математикѣ мы постоянно говоримъ о большихъ или меньшихъ значеніяхъ одной и той же величины, оперируемъ надъ этими понятіями совершенно независимо отъ того, идетъ ли рѣчь о той или о другой величинѣ. Ясно поэтому, что нѣкоторыми общими свойствами эти понятія должны обладать, хотя бы эти свойства и не облекались въ какіе-либо опредѣленные образы или представленія, и что этими общими свойствами, очевидно, только и пользуется математика. Постараемся эти свойства отыскать.

2. Прежде всего еще дѣтямъ объясняютъ, что „больше“ и „меньше“ можно говорить только объ однородныхъ предметахъ; теперь говорятъ обыкновенно, что понятія „равно“, „больше“, и „меньше“ примѣняются только къ „различнымъ значеніямъ одной и той же величины“. Мы опять-таки не будемъ входить въ анализъ того, что, собственно, такое однородные предметы: но одно совершенно ясно: всякій разъ, какъ мы говоримъ о „большемъ“ и „меньшемъ“, мы имѣемъ въ виду нѣкоторую опредѣленную совокупность или комплексъ предметовъ (въ самомъ общемъ смыслѣ этого слова — объектовъ мышленія), выдѣленныхъ тѣми или иными признаками въ особую категорію; къ отдѣльнымъ элементамъ этого комплекса, сопоставляя ихъ между собой, мы и примѣняемъ термины „больше“, „равно“, „меньше“. Какъ такого рода комплексы, мы разсматриваемъ совокупность всѣхъ прямолинейныхъ отрѣзковъ, совокупность всѣхъ угловъ, совокупность вѣсовъ, скоростей и т. д. Каждый такой комплексъ и составляетъ величину, а отдѣльные его элементы представляютъ собой различныя значенія этой величины. Но комплексъ только тогда претворяется въ величину, когда установлены критеріи, дающіе возможность распознать относительно любыхъ двухъ его элементовъ A и B , будетъ ли элементъ A равенъ B , больше B или меньше B . Теперь обратимся къ самымъ этимъ понятіямъ.

3. Всякій разъ, какъ мы въ математикѣ говоримъ о величинѣ и о различныхъ ея значеніяхъ, мы всегда предполагаемъ, что для любыхъ двухъ значеній A и B имѣетъ мѣсто одно и только одно изъ соотношеній:

$$A = B, \quad A > B, \quad A < B. \quad (1)$$

Воспользуемся установившимся въ логикѣ терминомъ. Если относительно нѣкотораго субъекта высказывается исключающее предположеніе, изъ которыхъ каждое исключаетъ всѣ остальные, а одно изъ нихъ непременно должно имѣть мѣсто, то говорятъ, что эти предположенія образуютъ полную дизъюнкцію. Если, напримѣръ, A есть

современная русская монета, то предложения:

монета A сделана изъ золота,

монета A сделана изъ серебра,

монета A сделана изъ мѣди

образуютъ полную дизъюнкцію. Возвращаясь къ соотношеніямъ (1), мы можемъ поэтому сказать: понятія „равно“, „больше“, „меньше“ таковы, что предложения (1) образуютъ полную дизъюнкцію для любыхъ элементовъ A и B какой угодно величины.

4. Согласно данному выше опредѣленію, изъ предложений, образующихъ дизъюнкцію, во-первыхъ, по крайней мѣрѣ, одно имѣетъ мѣсто, а, во-вторыхъ, каждое исключаетъ всѣ остальные. Сообразно этому указанное выше свойство понятій „равно“, „больше“ и „меньше“ сводится къ четыремъ требованіямъ, которымъ эти понятія должны удовлетворять. Обозначая черезъ A и B попрежнему любые элементы нашего комплекса (т.е. разсматриваемой величины), мы можемъ формулировать эти требованія слѣдующимъ образомъ:

а) Имѣетъ мѣсто, по крайней мѣрѣ, одно изъ соотношеній $A = B$, $A > B$, $A < B$.

б) Если имѣетъ мѣсто соотношение $A = B$, то не имѣетъ мѣста соотношение $A < B$.

с) Если имѣетъ мѣсто соотношение $A = B$, то не имѣетъ мѣста соотношение $A > B$.

д) Если имѣетъ мѣсто соотношение $A > B$, то не имѣетъ мѣста соотношение $A < B$.

Замѣтимъ, что предложения:

б') Если имѣетъ мѣсто соотношение $A < B$, то не имѣетъ мѣста соотношение $A = B$.

с') Если имѣетъ мѣсто соотношение $A > B$, то не имѣетъ мѣста соотношение $A = B$.

д') Если имѣетъ мѣсто соотношение $A < B$, то не имѣетъ мѣста соотношение $A > B$.

представляютъ лишь иное выраженіе предложений б), с) и д). Въ самомъ дѣлѣ, предложения б) и б'), напримѣръ, одинаково выражаютъ, что соотношенія $A = B$ и $A < B$ несовмѣстны, т.е. одновременно не могутъ быть истинными *).

*) Переходъ отъ предложений б), с), д) къ предложениямъ б'), с'), д') извѣстенъ въ логикѣ подъ названіемъ преобразованія предложений, а именно контрапозиціи.

5. Итакъ, предложенія а), б), в) и д) выражаютъ тѣ свойства понятій „равно“, „больше“ и „меньше“, которыя мы съ ними въ математикѣ неизмѣнно связываемъ. Но этимъ дѣло не ограничивается. Почти во всѣхъ сочиненіяхъ по алгебрѣ или геометріи явно (въ видѣ аксіомъ) или неявно выражены слѣдующія свойства этихъ понятій, которыя имъ всегда приписываются. Пусть A , B , C будутъ значенія нѣкоторой величины (элементы нѣкотораго комплекса):

е) Если $A = B$ и $B = C$, то $A = C$.

ф) Если $A > B$ и $B > C$, то $A > C$.

г) Если $A < B$ и $B < C$, то $A < C$.

Достаточно посмотрѣть на самыя записи этихъ трехъ предложеній, чтобы видѣть, что они одно отъ другого отличаются только тѣмъ, что въ одномъ мы имѣемъ знакъ $=$, въ другомъ на его мѣстѣ знакъ $>$, въ третьемъ знакъ $<$. Они выражаютъ какъ бы одно и то же свойство, принадлежащее каждому изъ трехъ понятій: „равно“, „больше“, „меньше“. Это свойство въ настоящее время называютъ транзитивностью, и заключается оно въ слѣдующемъ.

Положимъ, что элементы нѣкотораго комплекса могутъ стоять одинъ къ другому въ соотношеніи, которое мы обозначимъ черезъ α . Чтобы выразить, что элементъ A стоитъ въ соотношеніи α къ элементу B , мы будемъ писать: $A \alpha B$. Если характеръ этого соотношенія таковъ, что всякій разъ, какъ элементъ A стоитъ въ соотношеніи α къ элементу B , а элементъ B — въ томъ же соотношеніи α къ элементу C , элементъ A находится въ томъ же соотношеніи α къ элементу C , то это соотношение называется транзитивнымъ.

Приведемъ простыя примѣры. Положимъ, что комплексъ состоитъ изъ людей различныхъ поколѣній: соотношение α заключается, скажемъ, въ томъ, что лицо A есть предокъ лица B . Ясно, что это соотношение транзитивное: если A есть предокъ лица B , а B — предокъ лица C , то A есть предокъ лица C . Положимъ теперь, что комплексъ опять-таки представляетъ собой общество людей, изъ которыхъ одни относятся къ другимъ враждебно, другіе — дружелюбно или нейтрально. Пусть соотношение $A \lambda B$ выражаетъ, что лицо A относится враждебно къ лицу B . Если теперь имѣютъ мѣсто соотношенія $A \lambda B$ и $B \lambda C$, т. е. если A относится враждебно къ B , а B враждебно къ C , то A можетъ и не относиться враждебно къ C ; пожалуй, даже скорѣе наоборотъ: поэтому соотношение λ не обладаетъ транзитивностью.

Возьмемъ еще примѣръ изъ геометріи. Положимъ, что комплексъ состоитъ изъ нѣсколькихъ прямолинейныхъ треугольниковъ, и что соотношение $A \lambda B$ заключается въ томъ, что треугольникъ A подобенъ треугольнику B . Ясно, что, если $A \lambda B$ и $B \lambda C$, то $A \lambda C$; подобіе есть соотношение транзитивное. Если соотношение $A \mu B$ выражаетъ, что стороны треугольника A параллельны сторонамъ треугольника B , то и это соотношение будетъ транзитивное. Но если соотношение $A \nu B$ выражаетъ, что стороны треугольника A перпенди-

кулярны къ сторонамъ треугольника B , то изъ соотношеній $A \nu B$ и $B \nu C$ вытекаетъ не $A \nu C$, а $A \mu C$; соотношение ν не обладаетъ транзитивностью.

Итакъ, предложенія е), ф) и г) выражаютъ, что каждое изъ соотношеній, обозначаемыхъ терминами „равно“, „больше“, „меньше“, обладаетъ свойствомъ транзитивности.

Вся же совокупность предложеній а) — г) выражаетъ, что соотношенія „равно“, „больше“ и „меньше“ суть транзитивныя соотношенія такого рода, что предложенія 1) представляютъ полную дизъюнкцію для любыхъ двухъ элементовъ нашего комплекса.

6. До сихъ поръ мы еще не указали ни одного свойства понятій „равно“, „больше“ или „меньше“, которое существенно отличало бы одно изъ нихъ отъ другихъ: каждое изъ указанныхъ свойствъ равно принадлежить всѣмъ тремъ понятіямъ. Теперь мы укажемъ два свойства равенства, которые не принадлежатъ понятіямъ „больше“ и „меньше“. Первое изъ этихъ свойствъ есть обратимость.

Обратимость какого-либо соотношенія a заключается въ томъ, что изъ соотношенія $A a B$ всегда слѣдуетъ соотношеніе $B a A$. Такъ, разсмотрѣнное выше соотношеніе $A \lambda B$, выражающее, что треугольникъ A подобенъ треугольнику B , есть соотношение обратимое, ибо, если $A \lambda B$, то и $B \lambda A$; такимъ же образомъ обратимы и указанные выше въ видѣ примѣровъ соотношенія $A \mu B$ и $A \nu B$. Но если въ томъ же комплексѣ треугольниковъ соотношеніе $A \sigma B$ выражаетъ, что треугольникъ A лежитъ внутри треугольника B , то это, очевидно, есть соотношение необратимое.

б) Равенство есть соотношение обратимое: изъ соотношенія $A = B$ всегда слѣдуетъ соотношеніе $B = A$.

7. Теперь обратимъ вниманіе еще на одно обстоятельство. Мы сказали выше, что предложенія (1) выражаютъ полную дизъюнкцію, если A и B суть элементы комплекса. Мы не сказали „два элемента“ или „два различныхъ элемента“; мы подчеркиваемъ теперь, что A и B суть „элементы комплекса“; мы желали этимъ сказать, что все упомянутыя выше свойства должны имѣть мѣсто и въ томъ случаѣ, когда B есть тотъ же элементъ, что и A . Въ частности, слѣдовательно, и въ этомъ случаѣ предложенія (1) должны давать полную дизъюнкцію. Иначе говоря, должно имѣть мѣсто одно и только одно изъ соотношеній:

$$A = A, \quad A > A, \quad A < A. \quad (2)$$

Какъ извѣстно, мы всегда принимаемъ, что каждый элементъ комплекса (каждое значеніе величины) равенъ самому себѣ, т.е. что изъ соотношеній (2) всегда имѣетъ мѣсто только первое, а остальные ложны.

Такое свойство соотношенія называютъ возвратнымъ. Нѣкоторое соотношеніе элементовъ даннаго комплекса называется возвратнымъ, если каждый элементъ

комплекса находится въ этомъ соотношеніи къ самому себѣ.

Такъ, разсмотрѣнное выше соотношение λ (подобіе треугольниковъ) есть соотношение возвратное: каждый треугольникъ подобенъ самому себѣ. И соотношение μ (параллельность соответствующихъ сторонъ) есть соотношение возвратное, если мы смотримъ на совпаденіе двухъ прямыхъ, какъ на частный случай ихъ параллелизма. Но соотношение ν (перпендикулярность соответствующихъ сторонъ) не будетъ уже возвратнымъ.

i) Равенство есть соотношение возвратное: каковъ бы ни былъ элементъ A разсматриваемаго комплекса, $A = A$.

8. Мы еще разъ остановимся на соотношеніи μ (параллельность сторонъ). Какъ мы сказали выше, это соотношение будетъ возвратнымъ или не будетъ таковымъ въ зависимости отъ того, какъ мы понимаемъ параллелизмъ, — условимся ли мы считать двѣ совпадающія прямая параллельными или нѣтъ. Ясно, что это дѣло нашего соглашенія, что это зависитъ только отъ того, какое содержаніе мы сами въ этотъ терминъ вкладываемъ. Если мы будемъ настаивать на томъ опредѣленіи, что двѣ прямая въ плоскости параллельны, когда онѣ вовсе не имѣютъ общихъ точекъ, то совпадающія прямая нельзя будетъ признать параллельными, потому что таковыя имѣютъ безконечное число общихъ точекъ. Но если мы скажемъ, что мы будемъ называть двѣ прямая параллельными, когда онѣ либо совпадаютъ, либо вовсе не имѣютъ общихъ точекъ, то вопросъ получить рѣшеніе въ другомъ смыслѣ. Важно только исполнѣ ясно отдать себѣ отчетъ въ томъ, что это дѣло терминовъ, а потому дѣло нашего соглашенія. Но когда термины создаются цѣлыми поколѣніями или даже рядомъ поколѣній, то человѣкъ часто склоненъ забывать, что онъ и его предки были творцами этихъ понятій, и ищетъ фактовъ тамъ, гдѣ имѣютъ мѣсто только соглашенія. Недостаточное пониманіе этого обстоятельства вело и ведетъ къ неистислимымъ заблужденіямъ; исполнѣ выяснить это также составляетъ одну изъ задачъ настоящаго сочиненія.

§ 3. Выводныя свойства понятій „равно“, „больше“ и „меньше“

1. Однако, указанными свойствами отнюдь не исчерпываются всѣ свойства понятій „равно“, „больше“ и „меньше“, которыми приходится пользоваться въ математикѣ. Но замѣчательно, что всѣ такія свойства, поскольку они принадлежатъ этимъ понятіямъ, всегда, т.-е. независимо отъ формы осуществленія въ различныхъ величинахъ, представляютъ собой уже слѣдствія свойствъ а) — i). Къ выводу этихъ свойствъ понятій „равно“, „больше“ и „меньше“ мы теперь и перейдемъ.

2. Теорема I, 4. Соотношеніе $A > B$ исключаетъ соотношение $B > A$.

Теорема I, 2. Соотношение $A < B$ исключаетъ соотношение $B < A$.

Доказательства. 1) Если бы одновременно имѣли мѣсто соотношенія $A > B$ и $B > A$, то въ силу предложенія f) [которое имѣетъ мѣсто, каковы бы ни были элементы A , B и C (§ 2, 5)] существовало бы соотношение $A > A$. Но въ силу возвратности равенства [предл. i)] $A = A$; соотношенія же $A = A$ и $A > A$ совместно существовать не могутъ [предл. e)].

2) Если бы существовали совместно соотношенія $A < B$ и $B < A$, то въ силу предложенія g) имѣло бы мѣсто соотношение $A < A$, что несовмѣстимо съ соотношеніемъ $A = A$ [предл. i) и b)].

Теорема II, 1. Если $A > B$, то $B < A$.

Теорема II, 2. Если $A < B$, то $B > A$.

1) Такъ какъ A и B суть элементы нашего комплекса, то въ силу предложенія a) должно имѣть мѣсто, по крайней мѣрѣ, одно изъ трехъ соотношеній: $B = A$, $B > A$, $B < A$. Если мы поэтому обнаружимъ, что первыя два соотношенія при условіяхъ заданія не могутъ имѣть мѣсто, то тѣмъ самымъ будетъ доказано, что имѣетъ мѣсто третье соотношение.

Но соотношение $B = A$ влекло бы за собой соотношение $A = B$ [предл. h)], что несовмѣстимо съ заданіемъ $A > B$ [предл. c)]. Соотношеніе же $B > A$ несовмѣстимо съ заданіемъ $A > B$ въ силу теоремы I, 1. Слѣдовательно, имѣетъ мѣсто соотношение $B < A$.

2) И въ этомъ случаѣ должно имѣть мѣсто, по крайней мѣрѣ, одно изъ соотношеній: $B = A$, $B < A$, $B > A$ [предл. a)]. Но соотношение $B = A$ влечетъ за собой соотношение $A = B$ [предл. h)], что несовмѣстимо съ заданіемъ $A < B$ [предл. b)]; соотношение же $B < A$ несовмѣстимо съ заданіемъ $A < B$ въ силу теоремы I, 2. Поэтому имѣетъ мѣсто соотношение $B > A$.

3. Просматривая списокъ предложеній изъ числа a) — i), которыми мы воспользовались для доказательства теоремъ I и II, мы не находимъ въ немъ только одного, — именно, предложенія d). Это не случайность; мы хотимъ сказать, что причина этого заключается не въ томъ, что предложеніе d) ненужно для доказательства предложеній I и II, а коренится глубже. Именно, оказывается, что самое предложеніе d) есть слѣдствіе изъ предложеній a) — c) и e) — i). Это теперь нетрудно доказать. Въ самомъ дѣлѣ, предложенія I и II, какъ мы показали, представляютъ собой слѣдствія предложеній a) — c) и e) — i); мы можемъ поэтому и ими пользоваться при нашемъ доказательствѣ.

Теорема III (d). Если имѣетъ мѣсто соотношение $A > B$, то не имѣетъ мѣста соотношение $A < B$.

Доказательство. Допустимъ, что эти соотношенія существуютъ одновременно, т.-е. что $A > B$ и $A < B$.

Изъ соотношенія $A < B$ вытекаетъ соотношеніе $B > A$ (теорема II, 2). Но соотношенія $A > B$ и $B > A$ не могутъ имѣть мѣсто совмѣстно въ виду теоремы I, 1.

Итакъ, предложеніе d) должно быть опущено изъ числа основныхъ свойствъ понятій „равно“, „больше“ и „меньше“ въ томъ смыслѣ, что оно выводится изъ остальныхъ предложеній а) — с) и е) — i). Но теперь естественно вытекаетъ вопросъ, не представляетъ ли какое-либо изъ этихъ 8 предложеній слѣдствія изъ остальныхъ. Этимъ вопросомъ мы займемся ниже, въ § 8. Именно, мы тамъ докажемъ, что ни одно изъ этихъ 8 предложеній не представляетъ собою слѣдствія остальныхъ. Если не принять всѣхъ восьми, если принять только семь изъ нихъ, то этими средствами нельзя будетъ доказать ни этого восьмого предложенія, ни теоремъ I — III, ни доказываемыхъ ниже теоремъ IV — VIII. Вотъ почему эти восемь основныхъ предложеній принято называть постулатами сравненія.

4. Уже изъ транзитивности понятій „равно“, „больше“ и „меньше“ вытекаетъ очень важное ихъ свойство.

Если a есть какое-либо транзитивное соотношеніе и если имѣютъ мѣсто соотношенія

$$A_1 a A_2, A_2 a A_3, A_3 a A_4, \dots, A_{n-1} a A_n, \quad (1)$$

то имѣетъ мѣсто также соотношеніе $A_1 a A_n$.

Въ самомъ дѣлѣ, при $n=3$ это предложеніе представляетъ собой только выраженіе транзитивности соотношенія a . Посмотримъ, какъ доказывается это соотношеніе при $n=4$. Даны соотношенія: $A_1 a A_2, A_2 a A_3, A_3 a A_4$. Изъ первыхъ двухъ соотношеній въ силу транзитивности соотношенія a вытекаетъ соотношеніе $A_1 a A_3$; теперь изъ соотношеній $A_1 a A_3$ и $A_3 a A_4$ по той же причинѣ вытекаетъ соотношеніе $A_1 a A_4$. Ясно, что этотъ процессъ можно довести до любого числа элементовъ; математическій приемъ, который примѣняется для общаго доказательства предложенія, извѣстенъ подъ названіемъ „полной или математической индукціи“; читатель не затруднится примѣнить его въ этомъ доказательствѣ. вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ частные случаи этого общаго предложенія, мы получаемъ слѣдующія теоремы:

Теорема IV. Если $A_1 = A_2, A_2 = A_3, \dots, A_{n-1} = A_n$, то $A_1 = A_n$.

Теорема V. Если $A_1 > A_2, A_2 > A_3, \dots, A_{n-1} > A_n$, то $A_1 > A_n$.

Теорема VI. Если $A_1 < A_2, A_2 < A_3, \dots, A_{n-1} < A_n$, то $A_1 < A_n$.

5. Если a есть соотношеніе не только транзитивное, но и обратимое, то оно обладаетъ еще слѣдующимъ важнымъ свойствомъ: если существуютъ соотношенія $A a C$ и $B a C$, то существуетъ и соотношеніе $A a B$; иначе говоря, два элемента A и B , находящіеся въ соотношеніи a къ третьему элементу C , находятся и между собой въ томъ же соотношеніи a . Въ самомъ дѣлѣ, дапы соотношенія: $A a C$ и $B a C$; въ силу обратимости соотношенія a имѣетъ мѣсто также соотношеніе $C a B$; итакъ, соотношенія $A a C$ и $C a B$ существуютъ

совмѣстно; но въ такомъ случаѣ въ силу транзитивности соотношенія a имѣеть мѣсто соотношение $A \alpha B$.

Примѣняя этотъ выводъ къ соотношенію равенства [предложенія h) и i)], получаемъ:

Теорема VII. Если $A = C$ и $B = C$, то $A = B$, т. е. если два элемента комплекса (два значенія величины) равны третьему, то они равны между собой.

Теорема VIII. Если имѣеть мѣсто равенство или неравенство $A = B$, или $A > B$, или $A < B$, то оно не нарушится, когда мы одинъ изъ его элементовъ замѣнимъ равнымъ ему элементомъ.

Точнѣе говоря, это предложеніе распадается на слѣдующія 6 предложеній:

Теорема VIII, 1. Если $A = B$ и $A = C$, то $C = B$.

Теорема VIII, 2. Если $A = B$ и $B = C$, то $A = C$.

Теорема VIII, 3. Если $A > B$ и $A = C$, то $C > B$.

Теорема VIII, 4. Если $A > B$ и $B = C$, то $A > C$.

Теорема VIII, 5. Если $A < B$ и $A = C$, то $C < B$.

Теорема VIII, 6. Если $A < B$ и $B = C$, то $A < C$.

Доказательства. 1) и 2). Замѣтимъ, что теорема VIII, 2 есть не что иное, какъ выраженіе транзитивности равенства [предл. e)] и помѣщена здѣсь только для полноты. Теорема VIII, 1 непосредственно сводится къ теоремѣ VII. Въ самомъ дѣлѣ, такъ какъ $A = B$ и $A = C$, то по обратимости равенства [предл. h)] $B = A$ и $C = A$; слѣдовательно, $B = C$ (теорема VII) и $C = B$ [предл. h)].

3) Даны соотношенія: $A > B$ и $A = C$. Согласно предложенію а) должно имѣть мѣсто, по крайней мѣрѣ, одно изъ соотношеній $C = B$, $C > B$ или $C < B$.

Если бы имѣло мѣсто равенство $C = B$, то изъ соотношеній $A = C$ и $C = B$ вытекало бы соотношение $A = B$ [предл. e)] или теорема VIII, 2], что несовмѣстимо съ соотношеніемъ $A > B$ [предл. c)]. Итакъ, допущеніе $C = B$ должно быть отвергнуто. Такимъ же образомъ отвергнуто должно быть и допущеніе $C < B$. Въ самомъ дѣлѣ, такъ какъ $A > B$, то $B < A$ (теорема II, 1); если бы поэтому имѣло мѣсто соотношение $C < B$, то изъ соотношеній $C < B$ и $B < A$ вытекало бы соотношение $C < A$ [предл. g)], что несовмѣстимо съ равенствомъ $C = A$ [предл. b)], вытекающимъ изъ заданія $A = C$ [предл. h)]. Такъ какъ допущенія $C = B$ и $C < B$ должны быть отвергнуты, то $C > B$.

4) Даны соотношенія: $A > B$ и $B = C$. Согласно предложенію а) должно имѣть мѣсто, по крайней мѣрѣ, одно изъ соотношеній $A = C$, $A < C$, $A > C$. Если бы имѣло мѣсто соотношение $A = C$, то, въ виду заданія $B = C$, имѣло бы мѣсто и соотношение $A = B$ (теорема VII), что

противорѣчить заданію $A > B$ [предл. е)]. Если бы имѣло мѣсто соотношеніе $A < C$, то существовало бы и соотношеніе $C > A$ (теорема II, 2), и изъ совмѣстнаго существованія соотношеній $C > A$ и $A > B$ вытекало бы соотношеніе $C > B$ [предл. f)]; но это противорѣчитъ заданію $B = C$ или $C = B$ [предл. h) и c)]. Итакъ, допущенія $A = C$ и $A < C$ должны быть отвергнуты и потому $A > C$.

5) Даны соотношенія: $A < B$ и $A = C$. Такъ какъ $A < B$, то $B > A$ (теорема II, 2); изъ соотношеній же $B > A$ и $A = C$ вытекаетъ соотношеніе $B > C$ (доказанное уже предл. VIII, 4), или соотношеніе $C < B$ (теорема II, 1).

6) Даны соотношенія: $A < B$, $B = C$. Изъ соотношенія $A < B$ вытекаетъ соотношеніе $B > A$ (теорема II, 2); но изъ совмѣстнаго существованія соотношеній $B > A$ и $B = C$ вытекаетъ соотношеніе $C > A$ (доказанное уже предл. VIII, 3), или соотношеніе $A < C$ (теорема II, 1).

(Продолженіе слѣдуетъ).

Природа взрывчатыхъ веществъ.

А. Маршалля.

Взрывъ. — Когда газъ или паръ расширяются столь внезапно, что вызываютъ громкій звукъ, то мы говоримъ, что происходитъ взрывъ; такова, напримѣръ, причина взрыва парового котла или цилиндра со сжатымъ газомъ. Процессами взрыва пользуются въ машинахъ, работающих газамъ, керосиномъ, нефтью, и притомъ съ каждымъ днемъ все въ болѣе широкихъ размѣрахъ. Въ этихъ машинахъ матеріалъ, дающій взрывъ, состоитъ изъ смѣси воздуха съ горючимъ газомъ, паромъ или тонко распыленной жидкостью; при взрывѣ эти вещества внезапно превращаются въ водяной паръ и окислы углерода, которые представляютъ собою газы. Хотя, такимъ образомъ, всѣ указанные вещества способны къ взрывамъ, однако, ихъ не называютъ взрывчатыми. Послѣдній терминъ примѣняется исключительно къ тѣламъ жидкимъ или твердымъ, которыя при взрывѣ производятъ гораздо болѣе значительный эффектъ, чѣмъ газовыя смѣси, такъ какъ первоначальный объемъ этихъ тѣлъ гораздо меньше, чѣмъ объемъ газовыхъ смѣсей.

Взрывчатое вещество. — Взрывчатыми мы называемъ такія твердыя или жидкія вещества или смѣси ихъ, которыя при примѣненіи тепла или удара къ небольшой ихъ массѣ превращаются за весьма короткій промежутокъ времени въ болѣе стойкія вещества, главнымъ образомъ или исключительно газообразныя. При этомъ всегда происходитъ выдѣленіе значительнаго количества тепла, вызывающее пламя.

Развитіе газа. — Развитие газа (или пара) является существенным фактором взрыва. Это станетъ очевиднымъ на примѣрѣ термита. Послѣдній состоитъ изъ смѣси металлическаго окисла — обыкновенно, окиси желѣза — съ порошкообразнымъ алюминіемъ. При надлежащихъ условіяхъ алюминій превращается въ окись алюминія, а желѣзо или другой какой-либо металлъ въ весьма короткое время получается въ свободномъ видѣ. При этомъ выдѣляется огромное количество тепла, но взрыва мы здѣсь не имѣемъ, и именно потому, что при этомъ не развивается газъ. Благодаря этому термитъ можно употреблять для мѣстнаго нагрѣванія и для сварки.

Выдѣленіе тепла. — Существеннымъ условіемъ реакціи взрыва является также выдѣленіе тепла. Въ противномъ случаѣ поглощеніе энергіи, вызываемое работой, производимой взрывомъ, должно охлаждать взрывчатое вещество и, слѣдовательно, способствовать замедленію реакціи до ея полного прекращенія, если только тепло не будетъ доставляться извнѣ. Напримѣръ, углекислый аммоній очень легко разлагается на двуокись углерода, амміакъ и воду; однако, при этомъ происходитъ поглощеніе тепла; слѣдовательно, реакція происходитъ въ этомъ случаѣ слишкомъ медленно для того, чтобы носить характеръ взрыва. Съ другой стороны, азотнокислый аммоній разлагается на кислородъ, азотъ и воду съ освобожденіемъ тепла, а потому способенъ къ взрыву. Для того, чтобы взрывъ этотъ вызвать, нуженъ сильный импульсъ, но, разъ только реакція началась, энергія (или тепло), освобождающаяся при этомъ, способствуетъ дальнѣйшему распространенію взрыва, исключая тотъ случай, когда разсѣиваніе энергіи происходитъ быстрѣе, чѣмъ ея освобожденіе.

Чувствительность. — Еще одно существенное условіе, которое должно быть выполнено, чтобы назвать вещество взрывчатымъ, состоитъ въ томъ, чтобы реакція начиналась лишь послѣ того, какъ будетъ примѣненъ извѣстный импульсъ. Если реакція начинается самопроизвольно, то очевидно, что энергія ея не можетъ быть утилизирована въ формѣ взрыва. Смѣсь натрія съ водой вызываетъ выдѣленіе водорода съ освобожденіемъ тепла, но реакція наступаетъ здѣсь непосредственно послѣ того, какъ эти два вещества приходятъ въ соприкосновеніе. Для того, чтобы вызвать взрывъ различныхъ веществъ, требуются импульсы весьма различной величины. Нѣкоторые изъ этихъ веществъ, какъ, напримѣръ, азотнокислый діазобензолъ, взрываются уже при легкомъ прикосновеніи къ нимъ; подобныя взрывчатые вещества не имѣютъ практическаго значенія, такъ какъ они слишкомъ опасны. Другія, какъ, напримѣръ, гремучая ртуть, взрываются отъ умѣреннаго удара или отъ незначительнаго пламени; ихъ употребляютъ, главнымъ образомъ, для заряженія капсулъ и детонаторовъ, при чемъ небольшое ихъ количество служитъ для взрыва большой массы какого-либо другого, менѣе чувствительнаго взрывчатого вещества. Большинство употребительныхъ въ настоящее время взрывчатыхъ веществъ взрываются лишь при чрезвычайно сильномъ ударѣ, а многія изъ нихъ не взрываются отъ пламени на открытомъ воздухѣ.

при обычныхъ условіяхъ. Существуетъ тенденція пользоваться менѣе чувствительными взрывчатыми веществами, такъ какъ употребленіе ихъ болѣе безопасно; но никогда не слѣдуетъ забывать, что терминъ „безопасный“ въ примѣненіи къ взрывчатому веществу имѣетъ лишь относительный смыслъ. Всякое взрывчатое вещество предназначено для того, чтобы взорваться, и, если съ нимъ обращаться не такъ, какъ слѣдуетъ, то раньше или позже оно взорвется не тогда, когда нужно, и притомъ съ чрезвычайно непріятными послѣдствіями.

Въ то время, когда вопросъ о взрывчатыхъ веществахъ не былъ еще такъ хорошо разработанъ, какъ теперь, изобрѣтатели были склонны думать, что взрывчатое вещество сильно, а потому и цѣнно просто постольку, поскольку оно чувствительно. На самомъ же дѣлѣ въ этой области слишкомъ большая чувствительность есть черта совсѣмъ нежелательная. Въ срединѣ девятнадцатаго столѣтія влѣдствіе недостаточнаго пониманія этого основного начала были предложены многія весьма чувствительныя смѣси, какъ, напримѣръ, смѣсь хлорноватокислаго калия съ пикриновой кислотой.

Составныя части взрывчатыхъ веществъ. — Указанныя выше взрывчатые газовыя смѣси, употребляемыя въ машинахъ, работающих газомъ или нефтью, состоятъ изъ горючаго матеріала, въ составъ котораго входятъ, главнымъ образомъ, углеродъ и водородъ, и изъ воздуха, полезной составной частью котораго является кислородъ. Подобнымъ же образомъ почти всѣ имѣющіяся въ торговлѣ взрывчатые вещества состоятъ, съ одной стороны, изъ подлежащихъ сгоранію элементовъ, изъ которыхъ самыми важными являются углеродъ и водородъ, а съ другой стороны — изъ кислорода, скомбинированнаго какимъ-либо образомъ, но не непосредственно, съ углеродомъ и водородомъ. При взрывѣ кислородъ вступаетъ въ соединеніе съ водородомъ, образуя воду, и съ углеродомъ, образуя одноокись или двуокись углерода или же смѣсь двухъ послѣднихъ. Теплота, выдѣляющаяся при этомъ горѣніи, является главной или даже единственной причиной повышенія температуры. При образованіи указанныхъ двухъ окисловъ углерода выдѣляется весьма неодинаковое количество тепла: 12 гр. углерода, соединяясь съ 16 гр. кислорода, образуютъ 28 гр. одноокиси углерода съ выдѣленіемъ 29 большихъ калорій, а при соединеніи того же самаго количества углерода съ 32 гр. кислорода выдѣляется 97 большихъ калорій.

Слѣдовательно, взрывчатое вещество значительно дѣйствительнѣе въ томъ случаѣ, если оно содержитъ кислородъ въ количествѣ, достаточномъ для полного окисленія углерода въ двуокись; однако, эффектъ при этомъ до нѣкоторой степени ослабляется благодаря тому, что двуокись углерода обладаетъ высокой удѣльной теплотой. Во всякомъ случаѣ, для нѣкоторыхъ родовъ взрывчатыхъ веществъ развитіе очень высокой температуры является совершенно нежелательнымъ; это относится къ различнымъ видамъ бездымнаго пороха и къ взрывчатымъ веществамъ, употребляемымъ въ угольныхъ копяхъ. Поэтому бездымный порохъ долженъ вообще имѣть такой составъ, чтобы большая часть углерода окислялась только въ одноокись. Однако, при этомъ

всегда образуется также двуокись углерода, такъ какъ при выдѣленіи свободного водорода углеродъ отнимаетъ извѣстную часть кислорода отъ водяного пара; если же общее количество кислорода очень мало, то можетъ даже выдѣлиться чистый углеродъ. Въ случаѣ безопасныхъ взрывчатыхъ веществъ, употребляющихся въ каменноугольныхъ копяхъ, температура взрыва иногда умѣряется также при помощи пониженія процентнаго содержанія кислорода; однако, этотъ способъ въ данномъ случаѣ нельзя считать безупречнымъ, такъ какъ образующаяся при этомъ двуокись углерода ядовита. Поэтому для приготовления нѣкоторыхъ безопасныхъ взрывчатыхъ веществъ примѣняютъ, съ цѣлью понизить температуру взрыва, нѣкоторые другіе методы.

Носители кислорода. — Кислородъ можетъ содержаться въ отдѣльномъ химическомъ соединеніи (какъ, напримѣръ, въ селитрѣ), смѣшанномъ лишь механически съ горючимъ матеріаломъ, или же оба компонента могутъ быть соединены вмѣстѣ въ одномъ химическомъ соединеніи, какъ, напримѣръ, въ нитроглицеринѣ, тротилѣ и многихъ другихъ новѣйшихъ взрывчатыхъ веществахъ. Къ веществамъ, богатымъ кислородомъ, часто примѣняютъ названіе „носителей кислорода“; въ качествѣ таковыхъ употребляютъ чаще всего соли азотной, хлорноватой и хлорной кислотъ, въ которыхъ кислородъ находится въ соотвѣтствующемъ соединеніи съ азотомъ и хлоромъ. Обыкновенный порохъ, или „черный порохъ“, принадлежитъ къ классу взрывчатыхъ веществъ съ отдѣльнымъ носителемъ кислорода; такимъ носителемъ въ данномъ случаѣ является селитра. Помѣщенная на стр. 62 таблица указываетъ на свойства главнѣйшихъ носителей кислорода.

Изъ таблицы видно, что содержаніе полезнаго кислорода почти одно и то же въ соляхъ хлорноватой кислоты и въ соотвѣствующихъ соляхъ азотной кислоты, но въ то время, какъ соли хлорноватой кислоты распадаются съ выдѣленіемъ небольшого количества тепла, соли азотной кислоты, за исключеніемъ лишь аммоніевой, требуютъ значительнаго количества тепла для своего расщепленія. Поэтому взрывчатые вещества, содержащія соли хлорноватой кислоты, гораздо болѣе мощны, чѣмъ содержащія соли азотной кислоты, но они также очень чувствительны, если не принять специальныхъ мѣръ, чтобы сдѣлать ихъ болѣе инертными. Что касается солей хлорной кислоты, то онѣ требуютъ значительно меньше тепла для своего распада, чѣмъ нитраты, и содержатъ въ себѣ больше полезнаго кислорода. Такъ какъ при этомъ соли хлорной кислоты получаютъ въ настоящее время электролитическимъ путемъ и требуютъ весьма небольшихъ затратъ, то насъ нисколько не удивитъ тотъ фактъ, что эти соединенія въ болѣе широкихъ размѣрахъ входятъ въ употребленіе при изготовленіи взрывчатыхъ веществъ. Аммоніевыя соли азотной и хлорной кислотъ благодаря образованію воды распадаются съ выдѣленіемъ тепла, но вслѣдствіе той же причины количество полезнаго кислорода въ нихъ незначительно. Нитратъ аммонія можетъ взрываться самъ по себѣ, хотя лишь съ трудомъ, и тогда онъ даетъ большой объемъ газовъ при сравнительно невысокой температурѣ. Благодаря этой невысокой температурѣ нитратъ аммонія считается полезной составной частью

Носители кислорода:	Молекулярный взвѣсъ:	Плотность:	Реакция:	Колич. выдѣл. тепла		Колич. поглозн. кислорода	
				на граммолекулу:	на 100 гр.:	на 100 гр.:	на 100 куб. см.:

Соли азотной кислоты:

Калийная ...	101.1 ...	2.08 ...	$2\text{KNO}_3 = \text{K}_2\text{O} + \text{N}_2 + 5\text{O}$...	— 73.6 ...	— 74.8 39.5 ...	82
Натріевая ...	85.0 ...	2.26 ...	$2\text{NaNO}_3 = \text{Na}_2\text{O} + \text{N}_2 + 5\text{O}$...	— 60.5 ...	— 71.3 47 ...	106
Кальціевая ...	164.1 ...	2.36 ...	$\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 = \text{CaO} + \text{N}_2 + 5\text{O}$...	— 70.6 ...	— 43.0 49 ...	115
Баріевая ...	261.5 ...	3.2 ...	$\text{Ba}(\text{NO}_3)_2 = \text{BaO} + \text{N}_2 + 5\text{O}$...	— 94.4 ...	— 36.1 31 ...	98
Свинцовая ...	331.1 ...	4.58 ...	$\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 = \text{PbO} + \text{N}_2 + 5\text{O}$...	— 54.6 ...	— 16.5 24 ...	111
Аммонійная	80.1 ...	1.71 ...	$\text{NH}_4\text{NO}_3 = 2\text{H}_2\text{O} + \text{N}_2 + \text{O}$...	+ 27.6 ...	+ 34.5 20 ...	34

Соли хлорноватой кислоты:

Калийная ...	122.6 ...	2.00 ...	$\text{KClO}_3 = \text{KCl} + 3\text{O}$...	+ 11.9 ...	+ 9.7 39 ...	78
Натріевая ...	106.5 ...	2.29 ...	$\text{NaClO}_3 = \text{NaCl} + 3\text{O}$...	+ 13.1 ...	+ 12.3 45 ...	103
Баріевая ...	304.3 ...	3.18 ...	$\text{Ba}(\text{ClO}_3)_2 = \text{BaCl}_2 + 6\text{O}$...	+ 25.9 ...	+ 8.5 31.5 ...	100

Соли хлорной кислоты:

Калийная ...	138.6 ...	2.54 ...	$\text{KClO}_4 = \text{KCl} + 4\text{O}$...	— 7.8 ...	— 5.6 46 ...	117
Натріевая ...	422.5 ...	— ...	$\text{NaClO}_4 = \text{NaCl} + 4\text{O}$...	— 12.4 ...	— 10.2 52 ...	—
Баріевая ...	336.3 ...	— ...	$\text{Ba}(\text{ClO}_4)_2 = \text{BaCl}_2 + 6\text{O}$...	— 4.3 ...	— 1.3 38 ...	65
Аммонійная	17.5 ...	1.89 ...	$2\text{NH}_4\text{ClO}_4 = 2\text{HCl} + 3\text{H}_2\text{O} + 5\text{O}$...	+ 29.5 ...	+ 25.1 34 ...	—

безопасныхъ взрывчатыхъ веществъ, употребляющихся въ каменно-угольныхъ копяхъ; онъ входитъ также въ составъ многихъ другихъ взрывчатыхъ веществъ высокой силы. Хлорнокислый аммоній имѣетъ тотъ недостатокъ, что между продуктами его распаденія имѣется ядовитый газъ, именно хлористый водородъ.

Пользовались также марганцевоокислымъ и двухромовокислымъ калиемъ, но они не обладаютъ никакими особенными преимуществами. Взрывчатая вещества, содержащія марганцево-кислые соединенія, часто излишне чувствительны. Дѣлались также попытки пользоваться жидкимъ кислородомъ, который имѣетъ тѣ преимущества, что онъ дешевъ, и что количество полезнаго кислорода въ немъ, конечно, равно 100%, но трудности при пользованіи жидкостью, кипящей при температурѣ, ниже обыкновенной на 200° С., настолько велики, что указанныя попытки были оставлены. Во всякомъ случаѣ нѣмцы прилагаютъ большія усилія къ тому, чтобы усовершенствовать взрывчатые вещества только-что указаннаго типа примѣнительно для работъ въ копяхъ и такимъ образомъ освободить соотвѣтствующее количество нитратовъ для военныхъ нуждъ. По той же причинѣ германскіе авторитеты стоятъ за употребленіе хлорноватокислыхъ и хлорнокислыхъ солей.

Горючія составныя части. — Въ черномъ порохѣ горючими составными частями служатъ древесный уголь и сѣра. Въ вещества, служащія для взрывовъ въ горномъ дѣлѣ, входятъ, въ качествѣ составныхъ частей, различныя органическія субстанціи. Аналогичную роль играютъ также и нѣкоторыя неорганическія соединенія, каковы желѣзистосинеродистый калий, шавелевокислый аммоній и сѣрнистая сурьма; впрочемъ, на практикѣ число ихъ не очень велико. Взрывчатые вещества, содержащія нитроглицеринъ, должны содержать всасывающій матеріалъ; таковымъ чаще всего являются мелко толченое дерево, но въ нѣкоторыхъ случаяхъ ту же роль играютъ мука и крахмалъ, а изрѣдка даже мелко толченая дубовая кора и соотвѣтствующимъ образомъ обработанный лошадиный пометъ. Уголь, приготовленный изъ пробки, обладаетъ значительной абсорбирующей силой, но большая стоимость этого продукта препятствуетъ его примѣненію. Въ составъ нѣкоторыхъ взрывчатыхъ веществъ входитъ обыкновенный древесный уголь, равно какъ и угольная пыль. Американскіе динамиты часто содержатъ резину и сѣру: эти же составныя части встрѣчаются и въ другихъ взрывчатыхъ веществахъ. Маслянистые матеріалы, каковы касторовое масло, вазелинъ, а также парафинъ, уменьшаютъ чувствительность взрывчатыхъ веществъ; они обычно встрѣчаются въ продуктахъ, содержащихъ хлорноватокислые соли и служащихъ для взрывовъ въ горномъ дѣлѣ. Прибавленіе алюминія въ высшей степени увеличиваетъ температуру взрыва; этотъ металлъ встрѣчается въ взрывчатыхъ веществахъ аммонала.

Нитросоединенія ароматическаго ряда. — Новѣйшія взрывчатые вещества высокой силы очень часто содержатъ нитропроизводныя ароматическихъ соединеній, въ частности моно-, ди- и три-нитропроизводныя бензола, толуола и нафталина. Нитро-группы въ этихъ соединеніяхъ

доставляют кислородъ для реакціи взрыва. Тринитро-соединенія веществъ, содержащихъ одно лишь бензольное кольцо, сами по себѣ являются взрывчатыми веществами; примѣромъ можетъ служить тринитротолуолъ. Послѣдній является не только составной частью сложныхъ взрывчатыхъ веществъ, но также часто примѣняется самъ по себѣ въ качествѣ заряда для минъ и для другихъ военнотехническихъ и морскихъ цѣлей, для которыхъ онъ является подходящимъ вследствие своей малой чувствительности и значительной силы. Для тѣхъ же цѣлей часто употребляется пикриновая кислота (тринитро-фенолъ), рѣже тринитрокрезолъ. Эти тринитро-соединенія, хотя и взрываются съ большою силою, не содержатъ въ себѣ кислорода въ количествѣ, достаточномъ для окисленія всего содержащагося въ нихъ углерода даже въ двуокись. Поэтому взрывчатую ихъ силу увеличиваютъ при помощи смѣшенія ихъ съ носителями кислорода. Продажные взрывчатые вещества, содержащія тринитротолуолъ, всегда содержатъ также и другія составныя части, могущія доставить недостающій кислородъ.

Сложные азотнокислые эфиры. — Нитроглицеринъ и нитроцеллюлозы являются главными представителями другой весьма важной группы соединений, могущихъ служить взрывчатыми веществами безъ помощи какой-либо примѣси. Строго говоря, они представляютъ собою не нитро-производныя, а сложные азотнокислые эфиры. Наиболее высоко нитрированныя целлюлозы, какъ, напримѣръ, хлопчатобумажный порохъ, содержатъ кислородъ въ количествѣ, вполне достаточномъ для того, чтобы окислить весь водородъ въ воду, а углеродъ въ двуокись и даже отчасти въ двуокись. Кислородъ, содержащійся въ нитроглицеринѣ, $C_3H_5N_3O_9$, не только въ состояніи окислить весь его водородъ и углеродъ безъ остатка, но часть кислорода остается еще въ избыткѣ. Нитроглицеринъ — самое мощное изъ извѣстныхъ намъ взрывчатыхъ соединений, но сила его еще болѣе увеличивается при раствореніи въ немъ небольшого количества нитроцеллюлозы, которая утилизируетъ избытокъ кислорода и въ то же время превращаетъ нитроглицеринъ въ желатинозную твердую массу, извѣстную подъ названіемъ гремучаго студня.

Различные виды бездымнаго пороха. — Всѣ виды бездымнаго пороха состоятъ, главнымъ образомъ, изъ нитроцеллюлозы, болѣе или менѣе желатинизированной и превращенной въ компактный коλλоидъ помощью подходящаго растворителя. Многіе изъ нихъ практически больше ничего не содержатъ, но въ другихъ имѣется значительная доля нитроглицерина. Во многихъ случаяхъ прибавляютъ еще небольшія количества минеральнаго студня, неорганическихъ нитратовъ и другихъ веществъ съ той цѣлью, чтобы улучшить условія баллистики или повысить стойкость взрывчатого вещества. Порохъ для наръзнаго оружія всегда, насколько только возможно, превращается въ коλλоидъ, все равно, предназначенъ ли онъ для ружей или для пушекъ; это дѣлается съ той цѣлью, чтобы порохъ сгоралъ медленно и правильно; въ порохѣ же, предназначенномъ для огнестрѣльнаго оружія безъ наръзки, первоначальная структура нитроцеллюлозы не всегда оконча-

тельно уничтожена, такъ какъ въ этомъ случаѣ онъ долженъ сгорать быстро.

Эндотермическія соединенія. — Существуютъ нѣкоторые взрывчатые соединенія, дѣйствіе которыхъ совершенно не зависитъ отъ окисленія или возстановленія. Это вещества эндотермическія, распадающіяся съ развитіемъ газа и съ выдѣленіемъ тепла; обыкновенно они довольно чувствительны. Единственными соединеніями этого класса, имѣющими коммерческое значеніе, являются гремучая ртуть, $\text{Hg}(\text{CNO})_2$, и азидъ свинца, PbN_6 ; оба они употребляются съ цѣлью взрывать другія взрывчатые вещества.

Скорость взрыва. — Выдѣленная теплота и образовавшіеся газы — вотъ тѣ главные факторы, которые опредѣляютъ собою силу взрывчатого вещества, т. е. количество работы, которую оно можетъ произвести въ смыслѣ перемѣщенія предметовъ. Но большое значеніе имѣетъ и время, занимаемое взрывомъ. Скорость взрыва измѣняется такимъ образомъ, что взрывчатое вещество складываютъ въ видѣ столбика, заключающаго его, въ случаѣ надобности, въ металлическую трубку и измѣняютъ время, необходимое для того, чтобы волна взрыва прошла извѣстное пространство. По отношенію къ черному пороху и другимъ аналогичнымъ смѣсямъ, содержащимъ нитраты, скорость взрыва равна только немногимъ сотнямъ метровъ въ секунду; что же касается новѣйшихъ сильныхъ взрывчатыхъ веществъ, то скорость эта измѣняется числами отъ двухъ до семи тысячъ метровъ въ секунду, а это дѣлаетъ ихъ еще болѣе сильными и разрушительными. Взрывчатые вещества типа пороха употребляются тогда, когда нужно произвести взрывъ въ почвѣ или въ мягкой горной породѣ, а также и тогда, когда подлежащій взрыву матеріалъ не долженъ быть слишкомъ сильно разрушенъ. Вещества, употребляемые для выбрасыванія пуль или снарядовъ изъ огнестрѣльнаго оружія, должны горѣть медленно: въ случаѣ нарѣзного оружія они должны горѣть еще медленнѣе, чѣмъ порохъ. Они не взрываются помощью другого сильного взрывчатого вещества, а лишь зажигаются при помощи сильного пламени, и должны тогда горѣть въ видѣ концентрическихъ слоевъ. Скорость горѣнія усиливается вмѣстѣ съ увеличеніемъ давленія въ огнестрѣльномъ оружіи; для вполне желатинизированныхъ видовъ пороха скорость эта меньше одного метра въ секунду.

<http://vofem.ru>

Приём Эрмита при разложении числа на сумму двух квадратовъ.

И. Чирьева.

Въ дополненіе къ статьѣ А. Турчанинова (см. № 562 „Вѣстника“) позволяю себѣ напомнить читателямъ о приёмѣ Эрмита (Hérnite), который отличается особенною простотою.

Теорема. Каждое простое число вида $4n+1$ есть сумма квадратовъ двухъ чиселъ.

Извѣстно, что при простомъ p вида $4n+1$ среди чиселъ, меньшихъ, чѣмъ p , существуетъ такое число k , при которомъ

$$k^2 + 1 \equiv 0 \pmod{p}. \quad (1)$$

Развернемъ дробь $\frac{k}{p}$ въ непрерывную дробь и остановимся на такихъ двухъ смежныхъ подходящихъ дробяхъ $\frac{P}{Q}$ и $\frac{P_1}{Q_1}$, для ко-

торыхъ $Q^2 < p < Q_1^2$. Это всегда возможно, потому что квадратъ знаменателя первой подходящей равенъ 1 и, слѣдовательно, меньше p , а квадратъ знаменателя послѣдней подходящей есть p^2 и потому больше p . При этихъ условіяхъ неравенство

$$\left(\frac{P}{Q} - \frac{k}{p}\right)^2 < \frac{1}{Q^2 Q_1^2}, \quad \text{т.-е.} \quad (Pp - kQ)^2 < \frac{p^2}{Q_1^2}$$

$$\text{дастъ} \quad (Pp - kQ)^2 < p.$$

$$\text{Отсюда} \quad (Pp - kQ)^2 + Q^2 < p + Q^2, \quad \text{т.-е.} \quad P^2 p^2 - 2PpkQ + (k^2 + 1)Q^2 < 2p.$$

Въ силу соотношенія (1) лѣвая часть этого неравенства дѣлится на p ; слѣдовательно, $(Pp - kQ)^2 + Q^2 = p$, и теорема доказана. Такъ приблизительно излагаетъ Эрмитъ доказательство вышеприведенной теоремы, указывая вмѣстѣ съ тѣмъ путь для практическаго рѣшенія этого вопроса.

Въ заключеніе считаю нелишнимъ нѣсколько остановиться на рѣшеніи сравненія вида $\omega^2 + 1 \equiv 0 \pmod{4n+1}$; хотя изъ теоремы Вильсона и вытекаетъ, что одинъ изъ корней этого сравненія будетъ $(2n)!$ *, но нахожденіе корня, меньшаго, чѣмъ $4n+1$, приводитъ къ довольно сложнымъ арифметическимъ выкладкамъ.

*) См., напримѣръ, Веберъ и Вельштейнъ — „Энциклопедія Элементарной математики“, т. 1 (изд. 2-е), стр. 327.

Эти выкладки, по моему мнѣнію, можно свести къ нѣкоторому дѣйствию, которое можно было бы назвать извлеченіемъ квадратнаго корня изъ числа по данному модулю. Рѣшимъ, напримѣръ, сравненіе $\omega^2 + 1 \equiv 0 \pmod{29}$:

$$\omega_1 = \sqrt{-1} = \sqrt{28}.$$

Дѣйствіе извлеченія корня можно расположить такъ*):

$$\begin{array}{r} \text{mod } 29 \\ \sqrt{28} = 5 + 2 + 2 + 1 + 2 = 12, \text{ или } \frac{20 + 2 + 2}{2} = 12. \\ 10 + 2 \quad 32 \\ 2 \quad 24 \\ 14 + 2 \quad 37 \\ 2 \quad 32 \\ 18 + 1 \quad 34 \\ 1 \quad 19 \\ 20 + 2 \quad 44 \\ 2 \quad 44 \\ 0 \end{array}$$

Слѣдовательно,

$$12^2 + 1 \equiv 0 \pmod{29}, \quad 17^2 + 1 \equiv 0 \pmod{29}.$$

При этомъ возможны и упрощенія:

$$\begin{array}{r} \text{mod } 29 \\ \sqrt{28} = 2\sqrt{7}, \\ \sqrt{7} = 2 + 4 = 6, \text{ или } \frac{4 + 4 + 4}{2} = 6; \quad 2 \cdot 6 = 12. \\ 4 + 4 \quad 32 \\ 4 \quad 32 \end{array}$$

Слѣдовательно,

$$12^2 + 1 \equiv 0 \pmod{29}, \quad 17^2 + 1 \equiv 0 \pmod{29}.$$

*) Авторъ выполняетъ слѣдующій рядъ вычисленій: $\sqrt{28} = 5$; $5^2 = 25$; $28 - 5 = 3$; $3 + 29 = 32$; $5 \cdot 2 = 10$; $32 : 10 = 3$, но, такъ какъ $(10 + 3) \cdot 3 > 32$, то беремъ 2; $(10 + 2) \cdot 2 = 24$; $32 - 24 = 8$; $8 + 29 = 37$; $10 + 2 + 2$ [или $(5 + 2) \cdot 2] = 14$; $37 : 14 = 2$ и т. д.

Изъ записной книжки преподавателя.

Къ вопросу объ опредѣленіи понятія „аксіома“.

И. Дуба.

Въ популярномъ учебникѣ геометріи г. Киселева мы встрѣчаемъ слѣдующее опредѣленіе аксіомы: „Такъ называютъ истины, которыя, вслѣдствіе своей очевидности, принимаются безъ доказательства“. Намъ представляется, что слова „вслѣдствіе своей очевидности“ являются лишними. Возникаетъ вѣдь вопросъ, гдѣ признаки „этой очевидности“. Если кто-либо будетъ утверждать, что данное предположеніе, которое обычно доказывается, очевидно и поэтому должно быть принято безъ доказательства, то что можно возразить противъ этого.

Помимо этого, вѣдь естественнымъ результатомъ такого взгляда на аксіому былъ бы слѣдующій: нѣкоторые предположенія, какъ очевидныя, по существу оказались бы аксіомами.

Между тѣмъ факты говорятъ о противоположномъ.

Такъ, напримѣръ, въ учебникахъ Давидова и Вулиха предположеніе „кратчайшее разстояніе между двумя точками есть прямая“ не доказывается, между тѣмъ какъ въ учебникѣ Киселева это предположеніе доказывается, что, конечно, объясняется различнымъ расположеніемъ матеріала.

Еще хуже обстоитъ дѣло въ упомянутомъ учебникѣ Вулиха (учебникъ, принятый въ школахъ типа высшихъ начальныхъ). Тамъ сказано: „Нѣкоторые свойства такъ очевидны, что не могутъ быть доказываемы. Истины этого рода, т. е. выражающія свойства, столь очевидныя, что не требуютъ доказательства и не могутъ быть доказываемы, называются аксіомами“.

Здѣсь рѣзче подчеркнута „очевидность“ и, какъ результатъ очевидности, указано на невозможность доказать аксіому. Приведенный примѣръ съ извѣстнымъ свойствомъ прямой показываетъ, что не въ невозможности доказать аксіому тутъ дѣло, а въ расположеніи матеріала. Извѣстно также, что нѣкоторые предположенія могутъ въ качествѣ аксіомъ замѣнять другъ друга: принимая за аксіому одно предположеніе, мы докажемъ другое и обратно.

Наконецъ, если согласиться съ нами, что странно говорить объ очевидности предположенія по существу, то и строить заключеніе о недоказуемости на утвержденіи объ очевидности, по меньшей мѣрѣ, ненадеженъ.

ПОЛЕМИКА.

Отвѣтъ на замѣтку г. А. Арндта, помѣщенную въ № 655—656 „Вѣстника“.

Замѣтка г. Арндта, съ которой мнѣ пришлось только-что ознакомиться, на мой взглядъ какъ нельзя лучше доказываетъ, что я былъ совершенно правъ въ своей критикѣ статьи г. Арндта „О нѣкоторыхъ вопросахъ преподаванія ариометики“, помѣщенной въ № 638 „Вѣстника“. Мы остановимся только на слѣдующихъ выдержкахъ изъ этой замѣтки:

І. „30 лѣтъ тому назадъ не было полной теоріи геометрическихъ построеній, — пишетъ г. Александровъ. Да развѣ она теперь существуетъ? Еще въ 1908 г. тотъ же И. Александровъ, несомнѣнно, знатокъ этой области, въ предисловіи къ своему руководству „Методы рѣшеній геометрическихъ задачъ на построеніе“ (II-ое изданіе) говоритъ слѣдующее: «часто рѣшеніе геометрическихъ задачъ находится помощью произвольныхъ попытокъ, которыя, хотя и могутъ быть извѣстнымъ образомъ направляемы, но иногда довольно долго бываютъ безуспѣшны даже для умовъ наиболѣе проницательныхъ*». Даже въ этой наиболѣе развитой отрасли человѣческаго знанія весьма замѣтна недостаточность нашихъ средствъ къ изслѣдованію». Гдѣ же тутъ полная теорія? Во всякомъ случаѣ я былъ бы очень радъ познакомиться съ этой полной теоріей“. Далѣе, г. Арндтъ весьма неудачно пытается доказать, что въ настоящее время „полной теоріи“ конструктивныхъ задачъ не существуетъ, потому что иначе не требовались бы различныя догадки, безъ которыхъ трудно рѣшать конструктивныя задачи.

Во-первыхъ, приведенная выписка взята изъ предисловія къ моей книгѣ въ ея первомъ изданіи (1881 г.), что и указано надлежащей ссылкой въ предисловіи ко II-му изданію.

Во-вторыхъ, выписанныя г. Арндтомъ слова Дюгамеля были и будутъ справедливы для всякаго времени и для всякой теоріи, потому что, сколь бы ни была развита теорія, практическое ея примѣненіе всегда можетъ сопровождаться въ отдѣльныхъ случаяхъ большими трудностями. Требовать же отъ теоріи того, чтобы она позволяла рѣшить подлежащій ей вопросъ безъ всякихъ догадокъ, возможно лишь при поверхностномъ знакомствѣ съ теоріей и ея практикой.

Въ третьихъ, цѣль, съ которой упомянутый отрывокъ изъ предисловія къ I-му изданію моей книги включенъ въ предисловія къ другимъ изданіямъ, состояла никакъ не въ пониженіи цѣны теоріи построеній, которая за-границей была закончена ранѣе 1908 года, а въ желаніи ободрить учащихся на случай ихъ неудачи въ построеніи, такъ какъ эти неудачи особенно часто сопровождаютъ рѣшенія конструктивныхъ задачъ.

Въ четвертыхъ, полная теорія геометрическихъ построеній, отвѣчающая теоретически на всякій вопросъ изъ этой области, не только существуетъ, но

*) Эти слова принадлежатъ Дюгамелю.

она въ своемъ завершеномъ весьма красивомъ зданіи полна гармоніи и строгости. Укажу еще на то, что нѣкоторыя части этой теоріи едва ли возможно изложить элементарно, другія же части этой теоріи поддаются элементарному изложенію; и то и другое уже имѣется на русскомъ языкѣ.

II. Цитируя одно вполне правильное мѣсто изъ моихъ „Методовъ ариометическихъ задачъ“, г. Арндтъ отъ себя прибавляетъ: „типъ I: $x = f(a, b, c)$; типъ II: $f(x) = k$, гдѣ f есть ариометическая $(+, -, \times, :)$ функція“. Если даже съ натяжкой допустить терминъ „ариометическая функція“, то обозначеніе въ скобкахъ нельзя не признать неправильнымъ. Кромѣ того, я классифицировалъ по степенямъ не ариометическія задачи, а математическія задачи. Далѣе, г. Арндтъ, повидимому, не понимаетъ, что исключать уравненія изъ рѣшенія ариометическихъ задачъ — это не значить быть гонителемъ алгебры, тѣмъ болѣе, что въ примѣчаніи было указано мое отношеніе къ этому вопросу.

III. Что разумѣть г. Арндтъ подъ общеобязательнымъ курсомъ ариометики? Если это есть курсъ, согласованный съ дѣйствующими программами, то, по весьма вѣскимъ причинамъ, такое пониманіе не мирится съ истинно педагогическими цѣлями, а преподавателями-нечиновниками оно давно оставлено. Если же понимать этотъ курсъ въ духѣ современныхъ научныхъ теченій, то изъ него исключена большая часть тѣхъ вопросовъ, которымъ посвящена первоначальная статья г. Арндта, — не говорю уже о пріемахъ его рѣшеній этихъ вопросовъ. Поэтому всѣ аргументы г. Арндта, связанные съ указаннымъ терминомъ, сами собою отпадаютъ.

Въ остальныхъ частяхъ отвѣта г. Арндта я предоставляю читателямъ разобраться самимъ, безъ моихъ указаній.

И. Александровъ.

ЗАДАЧИ.

Подъ редакціей проф. Е. Л. Буницкаго.

Редакція проситъ не помѣщать на одномъ и томъ же листѣ бумаги 1) дѣловой переписки съ конторой, 2) рѣшеній задачъ, напечатанныхъ въ „Вѣстникѣ“, и 3) задачъ, предлагаемыхъ для рѣшенія. Въ противномъ случаѣ редакція не можетъ поручиться за то, чтобы она могла своевременно принять мѣры къ удовлетворенію нуждъ корреспондентовъ.

Редакція проситъ лицъ, предлагающихъ задачи для помѣщенія въ „Вѣстникѣ“, либо присылать задачи вмѣстѣ съ ихъ рѣшеніями, либо снабжать задачи указаніемъ, что лицу, предлагающему задачу, неизвѣстно ея рѣшеніе.

№ 347 (6 сер.). На плоскости даны точки A, B, C, D . На той же плоскости найти точку X такъ, чтобы величины $\angle XAB = \angle XBA$ и $CX \perp DX$ имѣли данныя значенія.

И. Александровъ (Москва).

№ 348 (6 сер.). Сколько существуетъ цѣлыхъ пятизначныхъ чиселъ, составленныхъ исключительно при помощи цифръ 3, 5, 7?

Н. Михальскій (Екатеринославъ).

№ 349 (6 сер.). Найти общий вид функций $f(x, y)$ удовлетворяющих равенству

$$f(x, y) = -f(x, y) + \varphi(x, y),$$

где $\varphi(x, y)$ есть данная функция. Какому условию должна удовлетворять функция $\varphi(x, y)$ для того, чтобы задача была возможна?

Н. С. (Одесса).

№ 350 (6 сер.). Решить уравнение

$$32 \cos^6 x - 48 \cos^4 x + 18 \cos^2 x = 1.$$

Р.

РѢШЕНІЯ ЗАДАЧЪ.

№ 308 (6 сер.) Дано, что медианы m_a и m_c треугольника ABC образуют со стороны AC углы, равные $31^\circ 15' 42''$ и $28^\circ 44' 48''$, и что площадь прямоугольника, построенного на этих медианах, равна $\sqrt{3}$. Вычислить безъ помощи тригонометрии площадь треугольника ABC .

Пусть G есть точка встрѣчи медіанъ AD и CE треугольника. По условию $\angle GAC + \angle GCA = 31^\circ 15' 42'' + 28^\circ 44' 18'' = 60^\circ$; поэтому $\angle AGE = \angle GAC + \angle GCA = 60^\circ$. Проведемъ высоту AH треугольника AGE . Такъ какъ

$$\angle HAG = 90^\circ - \angle AGE = 30^\circ, \text{ то } HG = \frac{1}{2} AG = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} AD = \frac{1}{3} m_a.$$

Поэтому

$$AH = \sqrt{AG^2 - HG^2} = \sqrt{\left(\frac{2}{3} AD\right)^2 - HG^2} = \sqrt{\left(\frac{2}{3} m_a\right)^2 - \left(\frac{1}{3} m_a\right)^2} = \frac{m_a}{\sqrt{3}},$$

откуда

$$\text{пл. } AEG = \frac{EG \cdot AH}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{EC}{3} \cdot AH = \frac{1}{2} \cdot \frac{m_c m_a}{3\sqrt{3}} = \frac{m_a m_c}{6\sqrt{3}}.$$

Но, по условию, $m_a m_c = \sqrt{3}$, а потому пл. $AEG = \frac{1}{6}$. Такъ какъ, въ силу равенства $EG:EC = \frac{1}{3}$, площадь AEG есть треть площади AEC , составляющей половину площади ABC , то площадь треугольника ABC въ шесть разъ больше площади треугольника AEG . Поэтому пл. $ABC = 6 \cdot \frac{1}{6} = 1$.

П. Волохинъ (Ялта); В. Поповъ (Валки).

№ 309 (6 сер.). Доказать, что сумма

$$2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{(p-1)(q-1)\dots(s-1)},$$

где p, q, \dots, s суть нечетныя простые числа, дѣлится на произведение $pq \dots s$.

Суммируя данную сумму по формулѣ геометрической прогрессіи, находимъ, что она равна

$$\frac{2(p-1)(q-1)\dots(s-1)+1-2}{2-1} = 2(2^{p-1}(q-1)\dots(s-1)-1).$$

Разность $2^{p-1}(q-1)\dots(s-1)-1$ дѣлится на каждую изъ разностей $2^{p-1}-1, 2^{q-1}-1, \dots, 2^{s-1}-1$, а каждая изъ нихъ, согласно съ теоремой Фермата, кратна соответственно чиселъ p, q, \dots, s , такъ какъ p, q, \dots, s суть по условію нечетныя простые числа. Поэтому и рассматриваемая сумма кратна каждому изъ неравныхъ между собою простыхъ чиселъ p, q, \dots, s , а потому кратна и ихъ произведенію $pq\dots s$.

Примѣчаніе. Въ условіи задачи, по недосмотру, не указано, что p, q, \dots, s суть неравные между собою простые числа, что слѣдовало, конечно, прибавить для ея точной формулировки.

М. Шебаршинъ (дѣйствующая армія).

Книги и брошюры, поступившія въ редакцію.

О всѣхъ книгахъ, присланныхъ въ редакцію „Вѣстника“, подходящихъ подъ его программу и заслуживающихъ вниманія, будетъ данъ отзывъ.

А. В. Цингеръ. *Начальная физика.* 1 ступень. Изд. 6-е, исправленное и дополненное, т-ва «В. В. Думновъ, насл. бр. Салаевыхъ». Москва. Стр. X + 554. Ц. 2 руб. 50 к.

Д. А. Бемъ, А. А. Волковъ и Р. Э. Струве. *Сокращенный сборникъ упражненій и задачъ по элементарному курсу алгебры.* Изд. книгоиздательства т-ва И. Д. Сытина. Москва, 1917. Стр. 328. Ц. 1 руб. 25 к.

Профессоръ Л. А. Сопочко. *Способы и средства числовыхъ вычисленій* Вып. 1. Точныя вычисленія. Москва, 1916. Стр. VIII+185. Ц. 1 руб. 50 к.

В. Е. Никоновичъ. *Научные и философскіе опыты.* Ч. II. Москва, 1916. Стр. 52. Ц. 75 к.

Н. Г. Лексинъ. *Опытъ практическаго руководства по методикѣ арифметики.* Изд. II, исправленное и дополненное, книжнаго магазина Маркелова и Шаронова. Казань, 1917. Стр. 422. Ц. 2 руб. 80 к.

Его же. *Методика алгебры* (Методическія указанія и примѣрные уроки по наглядно-лабораторному способу). Изд. книжнаго магазина Маркелова и Шаронова. Стр. 243. Ц. 3 руб.

Редакторъ прив.-доц. В. Ф. Каганъ.

Издатель В. А. Гернегъ.

Дозволено военной цензурой.

Типографія „Техникъ“—Одесса, Екатерининская, 58.

Обложка
щется

Обложка
щется