

Обложка  
ищется

Обложка  
ищется

# ВѢСТНИКЪ ОПЫТНОЙ ФИЗИКИ и ЭЛЕМЕНТАРНОЙ МАТЕМАТИКИ.

**№ 200**

**Содержание:** Къ изучению лучедѣятельности въ природѣ. Принципъ пассивности взаимодѣйствія. Эр. Шпачинскало.—Рецензіи. Ф. Н. Шведовъ. Методика физики. Выпускъ I. Введеніе. Одесса. 1894. (Окончаніе). Безличнало.—Научная хроника. В. Г.—Разныя извѣстія.—Доставленія въ редакцію книги и брошюры.—Задачи на испытанияхъ зрѣлости.—Задачи №№ 120—125.—Рѣшенія задачъ 3-ей сер. №№ 4, 7 и 41; 2-ой сер. № 268.—Полученные рѣшенія задачъ.—Библиографіческій листокъ новѣйшихъ русскихъ изданій.—Библиографіческій листокъ новѣйшихъ англійскихъ изданій.—Библиографіческій листокъ новѣйшихъ нѣмецкихъ изданій.—Объявленія.

## КЪ ИЗУЧЕНИЮ ЛУЧЕДѢЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ ПРИРОДѢ.

### ГЛАВА II\*).

#### Принципъ пассивности взаимодѣйствія.

Упреки по адресу физиковъ за то что, увлекаясь изяществомъ математической интерпретаціи явлений природы, они уклонились въ сторону фикцій и создали цѣлый рядъ научныхъ представлений, ничего общаго съ міромъ реальнымъ не имѣющихъ,—слышатся въ послѣднее время все чаще и чаще \*\*). Если это не служитъ еще признакомъ, что поворотъ въ сторону болѣе конкретнаго уясненія физическихъ явлений уже сдѣланъ, то во всякомъ случаѣ составляетъ несомнѣнное указаніе своеевременности попытокъ въ этомъ направлениі.

Какъ на одну изъ такихъ попытокъ, прошу смотрѣть и на настоящую статью, въ которой, ради примиренія того, что называются „фикціями“, съ тѣмъ, что понимается нами какъ реальность, я предлагаю принять, вмѣсто отжившаго свое время *принципа активности взаимодѣйствія*, другой, болѣе соотвѣтствующій современнымъ взглядамъ,—именно прямо противоположный ему *принципъ пассивности взаимодѣйствія*.

\* ) Соображенія, высказанныя въ настоящей Главѣ II, вполнѣ независимы отъ излагаемыхъ въ Главѣ I („Дѣйствіе свѣта на бактеріи“, № 193, стр. 3—12), продолженіе которой будетъ помѣщено позже.

\*\*) См. напр. статью проф. Любимова „Важнѣйшая изъ задачъ современной физики“ въ №№ 92 и 93 „Правит. Вѣстника“, перепечатанную въ одномъ изъ послѣднихъ №№ „Вѣстника Оп. Физики“ (№ 198, стр. 121—126).

ствія. Мнѣ въ особенности кажется желательнымъ включение этого принципа въ число общихъ и основныхъ началь физики съ педагогической точки зрѣнія, въ видѣ задатка, уплачиваемаго новому поколѣнію, на дальнѣйшее развитіе естествовѣдѣнія, и потому я полагалъ бы умѣстнымъ упомяннутую замѣну принциповъ произвести и въ курсахъ элементарной физики.

Считаю нелишнею еще одну оговорку: если высказываемая здѣсь соображенія, которыя, вѣроятно, вызовутъ протестъ, не выдѣлены въ особую статью, а только въ особую главу статьи о лучедѣятельности въ природѣ, то лишь потому что я *лично*, склоняюсь въ сторону гипотезы о весьма интимной связи взаимодѣйствія тѣлъ вообще съ лучедѣятельностью, и что, вслѣдствіе этого, выясненіе принципа пассивности взаимодѣйствія представляется мнѣ выясненіемъ одного изъ основныхъ положеній ученія о лучедѣятельности. Тѣмъ не менѣе этотъ принципъ, какъ мнѣ кажется, и помимо какихъ бы то ни было гипотезъ долженъ имѣть самостоятельное значеніе, какъ одинъ изъ общихъ принциповъ физики. Съ этой именно точки зрѣнія я и предлагаю оцѣнить его господамъ преподавателямъ, не связывая его отнюдь съ тѣми допущеніями, которыя будутъ изложены ниже въ слѣдующихъ главахъ.

Хотя принципъ активнаго взаимодѣйствія двухъ тѣлъ никогда, кажется, не былъ установленъ явно какъ основное положеніе науки, и формулированъ подобно другимъ принципамъ, однакожъ, всѣмъ известно, что неявно онъ былъ принятъ и остается принятъ понынѣ, не только во всѣхъ отдалахъ физики, но и въ другихъ отрасляхъ естествознанія. Принималось и принимается, что два материальныя тѣла *могутъ* дѣйствовать сами по себѣ другъ на друга, и, не смотря на то, что наблюденіе и опытъ убѣждаютъ только въ существованіи такихъ же точно результатовъ явлений, какіе получились бы и въ томъ случаѣ, когда упомянутое взаимодѣйствіе тѣлъ существовало бы на самомъ дѣлѣ, и не даютъ намъ никакихъ другихъ доказательствъ въ пользу такого активнаго отношенія материальныхъ тѣлъ другъ къ другу, не смотря на это, повторяю, *возможность* взаимодѣйствія тѣлъ была принята безъ доказательствъ, внесена въ физику какъ одинъ изъ основныхъ ея постулатовъ и положена въ основу всей динамики, а вмѣстѣ съ этой послѣднею—и тѣхъ наукъ, которыя могутъ пользоваться ея приложеніемъ. Мало того,—даже такія науки какъ химія, не особенно тѣсно связанныя пока съ динамикой и обходящіяся безъ фиктивныхъ представлений о силахъ, приложенныхъ къ массамъ, не составляютъ исключенія въ этомъ отношеніи и, незамѣтно, усвоили активность взаимодѣйствія какъ научный принципъ. Такъ, для химика взаимодѣйствіе двухъ какихънибудь элементовъ, изъ коихъ путемъ *реакціи* можетъ составиться новое сложное тѣло, какъ будто вовсе не подвержено нынѣ сомнѣнію; такая увѣренность въ томъ, что химические элементы дѣйствительно другъ на друга *дѣйствуютъ*, отразилась даже въ терминологіи: слова „химическое средство“, „реакція“ и пр. по своему истинному смыслу выражаютъ не что иное, какъ именно принципъ активности вещества.

Между тѣмъ этотъ принципъ находится въ явномъ противорѣчіи съ другимъ, тоже общимъ принципомъ естествознанія, а именно съ

принципомъ инерціи. Въ самомъ дѣлѣ, если, согласно послѣднему, мы принимаемъ, что вещество само на себя никакого дѣйствія оказывать не можетъ, то нѣть логического основанія допускать, что въ то же время оно можетъ оказывать то либо другое дѣйствіе на другое вещество. Такое противорѣчіе можно допустить не иначе, какъ при условіи, чтобы *разстоянію* между такими двумя вещественными массами, т. е. величинѣ чисто геометрической, была присвоена роль *физического дѣятеля*. Но такъ какъ идея о пространствѣ (равно какъ и идея о времени) никакъ не можетъ быть логически связана съ идеей дѣйствія на массу, занимающую опредѣленную часть этого пространства, то, разъ мы видимъ себя вынужденными приписать „*разстоянію*“ между двумя инертными массами роль активную въ процессѣ взаимодѣйствія, намъ не представляется иного исхода, какъ только *вообразить* въ томъ же пространствѣ третье, особаго вида материальное тѣло, въ формѣ активной *среды*, выполняющей это пространство безъ пустоты, и надѣленное способностью воздѣйствовать на данный массы, при данныхъ условіяхъ, такъ, какъ будто эти массы непосредственно взаимодѣйствуютъ другъ на друга.

Въ принятіи такой неподлежащей непосредственному наблюденію среды, обладающей вышеуказанной способностью и, стало быть, вполнѣ отличной отъ того, что мы называемъ инертнымъ веществомъ, нѣть еще никакой *гипотезы*, ибо подъ гипотезой должно понимать всякое такое лишь допущеніе, которое для нашего ума *не обязательно*; между тѣмъ допущеніе существованія универсальной среды, обусловливающей наблюдаемое нами взаимодѣйствіе тѣль на разстояніи, въ такой же мѣрѣ логически обязательно для нашего ума, какъ и допущеніе, что всякое слѣдствіе должно имѣть причину, хотя бы мы и постичь ея не могли. Напротивъ, гипотезой будетъ всякая новая способность, которую мы пожелаемъ или найдемъ удобнымъ приписать (хотя бы временно) той же средѣ, на основаніи тѣхъ либо другихъ аналогій со свойствами известныхъ намъ тѣль\*).

Итакъ, во избѣжаніе противорѣчій съ прочно установленнымъ въ наукѣ принципомъ инерціи или „*самонедѣятельности*“ вещества, и для выясненія конкретнаго смысла всего ученія о взаимодѣйствіи тѣль, необходимо присоединить къ числу *основныхъ положеній физики принципа пассивности взаимодѣйствія*, устранивъ изъ нея въ то же время прежній, неявно принятый принципъ активнаго взаимодѣйствія.

Формулировать этотъ принципъ пассивности можно приблизительно такъ: *Вещество, подлежащее нашимъ наблюденіямъ, само по себѣ инертно, и взаимодѣйствіе всякихъ двухъ материальныхъ тѣль было бы немыслимо безъ участія некоторой среды.*

Принять такой постулатъ, разсмотримъ теперь конкретное значеніе трехъ основныхъ принциповъ динамики (не совсѣмъ правильно называемыхъ часто тремя „законами“ Ньютона).

\*) Чтобы не подавать повода къ недоразумѣнію, будто упоминаемой здѣсь активной средѣ приписываются какія нибудь специальные свойства, я умышленно избѣгаю называть ее *этиромъ*.

**1. (Принципъ инерці). Состоянія покоя или движенія матеріального тѣла не можетъ измѣнить ни время, ни пространство.** Иными словами: материальное тѣло само по себѣ не можетъ ни начать перемѣщаться, ни перестать перемѣщаться съ данною скоростью и въ данномъ направлениі. Строго говоря, въ вышеприведенныхъ курсивомъ изображенныхъ словахъ заключается *весь* смыслъ принципа инерціи. Для „раціональной“ механики—этого вполнѣ достаточно, но для физики—этого мало, ибо въ такой формулировкѣ принципъ инерціи былъ бы неприложимъ къ наукамъ опытнымъ, уже потому, что эти послѣднія не вправъ основывать изучаемыя ими случаи *действительного* движенія на принципѣ *идеального* движенія. Это различіе нерѣдко опускается изъ виду, и потому многие ошибочно принимаютъ, будто принципъ инерціи въ физикѣ имѣеть точно такое же значеніе, какъ и въ рациональной механикѣ. Между тѣмъ различіе здѣсь весьма существенно, потому что физика (и всѣ другія науки, пользующіяся ея законами) давно была вынуждена отказаться отъ такого пространства, которое ничѣмъ не выполнено, и рассматривается только движенія реальныхъ, т. е. такихъ которыхъ совершаются въ нѣкоторой *средѣ*. Въ силу этого, разъ мы допускаемъ существованіе универсальной среды, выполняющей все подлежащее нашему наблюденію пространство, мы должны также дополнить соответственно такому допущенію и принципъ инерціи, и формулировать его такъ: *Состоянія покоя или движенія матеріального тѣла не можетъ измѣнить ни время, ни пространство, ни выполняющая таковое среда.* Очень можетъ быть, что такимъ дополненіемъ мы утверждаемъ слишкомъ много, гораздо болѣе того, на что намъ даютъ право наблюденіе и опытъ, ибо такъ понимаемый принципъ инерціи является построеннымъ на условномъ допущеніи, будто та среда, которая выполняетъ пространство, вездѣ однородна и лишена способности измѣнять направленіе и скорость движенія массы, каковы бы они ни были. Отсюда видимъ, что въ динамикѣ инерція принимается какъ *принципъ*, а въ физикѣ—какъ *гипотеза*.

**2. (Принципъ независимости дѣйствія силъ).** *Пассивного взаимодѣйствія двухъ матеріальныхъ тѣлъ не можетъ измѣнить присутствіе какою бы то ни было третьего матеріального тѣла.* Это значитъ, что каково бы ни было число тѣлъ, на которыхъ среда воздѣйствуетъ, для каждой пары ихъ взаимодѣйствіе будетъ такимъ же, какъ и въ случаѣ отсутствія всѣхъ остальныхъ тѣлъ. Такое положеніе, какъ *общий* принципъ независимости взаимодѣйствій, можетъ быть принятъ только въ динамикѣ; для физики же—оно было бы непозволительнымъ, какъ гипотеза равносильная допущенію, будто *всѣ* подлежащие наблюденію случаи пассивного взаимодѣйствія, обусловливаемаго средою, подходитъ подъ одинъ и тотъ же типъ такого взаимодѣйствія, которое образно иллюстрируется въ динамикѣ посредствомъ *воображаемыхъ* „центральныхъ силъ“. Такая гипотеза была бы, очевидно, слишкомъ смѣло, ибо, кроме случаевъ взаимодѣйствія, подходящихъ напр. подъ типъ взаимодѣйствія „тяготѣющихъ“ массъ, мы наблюдаемъ въ природѣ и другіе, иллюстрація которыхъ посредствомъ *воображаемаго дѣйствія силъ* либо очень затруднительна, какъ напр. электромагнитная взаимодѣйствія\*), либо даже вовсе для нихъ недоступна, какъ напр. хи-

\*.) Въ одной изъ прежнихъ моихъ статей („Внѣшнія дѣйствія тока“, см. „В. О. Ф.“ №№ 97, 98, 100 и 107) я задался цѣлью показать, что всѣ электродинамическія

міческія взаимодѣйствія\*). Въ этомъ несоответствіи 2-го основнаго принципа динамики требованіямъ физики и химії, имѣющими дѣло съ реальными, а не идеальными взаимодѣйствіями, заключается, по моему мнѣнію, причина, дѣлающая насильное примѣненіе этого принципа къ физикѣ столь стѣснительнымъ, а къ химії — и вовсе невозможнымъ. Желаніе сохранить во чтобы то ни стало за этимъ принципомъ значеніе общаго принципа, примѣнимаго ко всѣмъ физическимъ явленіямъ, даже къ электрическимъ и магнитнымъ, лучше всего обнаруживается фактомъ включенія въ теоретическую физику понятія о *фиктивныхъ массахъ* электрическихъ и магнитныхъ. Эти несуществующія и лишенныя даже самонедѣятельности массы были придуманы, очевидно, ради того только, чтобы можно было свести электрическія и магнитныя взаимодѣйствія къ типу „тѣготѣющихъ“, чтобы центральнымъ электрическимъ и магнитнымъ силамъ дать „точки приложенія“\*\*). Но — необходимо ли все это? — вотъ въ чемъ вопросъ. Вѣдь „рationalная“ динамика не одна возможна, и — подобно тому какъ, принявъ тѣ либо другія основныя положенія за геометрическія аксиомы, можно построить неопределенно много системъ воображаемыхъ геометрій помимо Евклидовы, — такъ же точно можно построить сколь угодно много системъ динамикъ,

явленія могутъ быть выведены какъ простыя слѣдствія изъ двухъ основныхъ положеній, характеризующихъ воздействиѳ среды на проводникъ тока, а именно: 1) изъ факта, что проводникъ (замкнутый), по которому проходить токъ, стремится подъ влияніемъ среды обніять возможно большую площадь, и 2) что тотъ же проводникъ подъ влияніемъ среды стремится сузиться до возможно малаго поперечного разрѣза. При этомъ было указано, что какъ первое такъ и второе воздействиѳ среды на проводникъ *не могутъ* быть образно представлены посредствомъ силъ, дѣйствующихъ на проводникъ въ нормальныхъ къ нему направленихъ, ибо такое представление приводитъ къ слѣдствіямъ несогласнымъ съ опытомъ.

\*) Въ химії, повидимому, не можетъ быть и рѣчи о принятіи принципа независимости взаимодѣйствія, аналогичнаго принципу независимости дѣйствія силъ. Здѣсь, напротивъ, извѣстно очень много такихъ реакцій, которыхъ ходъ обусловливается присутствіемъ третьего тѣла. Напримеръ: ціанистый калій ( $KCN$ ) образуется при пропусканіи азота надъ раскаленной смѣсью угла съ каліемъ или съ ёдкимъ кали; сѣрнистый ангидридъ ( $SO_2$ ) не соединяется непосредственно съ кислородомъ, а лишь въ присутствіи губчатой платины или окиси азота; бѣльянная извѣстъ ( $CaCl_2O_2$ ) разлагается на хлористый кальцій и кислородъ только въ присутствіи нѣкоторыхъ окисловъ, напр. окиси кобальта, при нагреваніи, и пр.

\*\*) Понятіе о „силѣ“ безспорно очень древняго происхожденія. Въ основе его и до настоящаго времени остается грубое представление о *веревкѣ*, при посредствѣ которой перемѣщается нѣкоторая масса. Динамика трактуетъ, только о такихъ веревочныхъ силахъ (векторахъ), немыслимыхъ безъ точекъ приложенія. Между тѣмъ въ случаѣхъ реальныхъ перемѣщений массъ природа не указываетъ намъ никакихъ опредѣленныхъ точекъ, въ коихъ концентрируется взаимодѣйствіе этихъ массъ. „Центръ инерції“ — понятіе столь же отвлеченное, какъ и масса  $m$ , сосредоточенная въ одной геометрической точкѣ. Быть можетъ, поэтому, для физики оказалось бы болѣе подходящимъ такое обобщеніе понятія о силѣ, которое, помимо обыкновенныхъ векторныхъ силъ, *тянувшихъ* массу въ опредѣленномъ направлениѣ и приложеніяхъ къ опредѣленнымъ точкамъ, допускало бы представление и о такихъ силахъ *толкающихъ*, или лучше сказать, *выдавливающихъ* массу изъ занимаемаго ею мѣста, районъ дѣйствія которыхъ обнимаетъ всю поверхность этой массы. Если такихъ силъ мы не можемъ изобразить наглядно на плоскомъ чертежѣ, — это еще не ручательство, что *всѣ* взаимодѣйствія между тѣлами природы должны динамически подходить подъ типъ *прямолинейнаго* взаимодѣйствія.

принявъ тѣ либо другія условія дѣйствія силъ за основные принципы. Изъ всѣхъ такихъ системъ слѣдуетъ ли считать наиболѣе удобною для приложенія къ изученію явлений природы именно нашу рациональную механику? Я позволяю себѣ сомнѣваться, ибо химія этой системой почти вовсе пользоваться не можетъ, а физика — ужъ слишкомъ испещрена параллелограмомъ силъ\*).

3. (Принципъ равенства дѣйствія и противодѣйствія). *Коми чест вен но, взаимодѣйствіе не зависитъ отъ того, въ какомъ изъ двухъ прямо противоположныхъ направлений измѣряется его эффектъ.* Это не новый принципъ, а простое слѣдствіе основнаго принципа пассивности взаимодѣйствія, ибо, разъ мы допускаемъ, что въ природѣ нѣть дѣйствія одного какого либо тѣла А на другое В, а возможно только взаимодѣйствіе этихъ тѣлъ А и В, то очевидно величина этого взаимодѣйствія, подлежащая нашимъ измѣреніямъ, должна оказаться одинаковою, будемъ ли мы измѣрять ее для тѣла А или для тѣла В.

Такимъ образомъ изъ трехъ основныхъ принциповъ ученія о силахъ: первый можетъ быть принятъ въ физикѣ какъ одна изъ основныхъ гипотезъ, второй — не долженъ быть принятъ потому что неявно заключетъ въ себѣ весьма мало вѣроятную гипотезу, касающуюся свойствъ той среды, которая не подлежитъ нашимъ наблюденіямъ, и предрѣшающую характеръ возможныхъ ея воздействиій, третій — наконецъ — представляетъ простое слѣдствіе принципа пассивности взаимодѣйствія, или — лучше сказать — тотъ опытный общій фактъ, для объясненія котораго приходимъ, путемъ индуктивнаго мышленія, къ установкѣ этого принципа.

Перехожу теперь къ разъясненію конкретнаго смысла основныхъ положеній ученія обѣ энергій.

Профессоръ Пильчиковъ, въ своей статьѣ „Основные принципы энергетики“, недавно помѣщенной въ „Вѣстникѣ Оп. Физики“\*\*), говорить: „ученіе обѣ энергіи это не отдѣль физики, это — вся физика, понимаемая какъ „натуральная философія“. Тѣмъ болѣе причинъ устранить изъ этого ученія все то, что съ философской точки зрѣнія не выдерживаетъ критики.

Сюда относится прежде всего понятіе о такъ называемой *потенциальной энергіи* или *энергіи положенія*, идущее въ разрѣзъ съ конкретнымъ представленіемъ обѣ энергіи вообще. Это наслѣдіе, завѣщанное современной наукѣ такъ долго господствовавшимъ въ натуральной философіи принципомъ активнаго взаимодѣйствія тѣлъ. Быть можетъ,

\*.) Мнѣ кажется, что физика переживаетъ теперь эпоху столь же мало соотвѣтствующаго дѣйствительности геометрическаго толкованія явлений, какъ и астрономія въ періодѣ времени отъ Птоломея до Кеплера, когда геометрическое представление о видимомъ движении небесныхъ тѣлъ сводилось обязательно къ идеи *кругового* движения. Подобно тому какъ, благодаря такому предвзятому мнѣнію, астрономія превратилась тогда въ запутанную и крайне искусственную систему эпіцикловъ, теперь физика не умѣеть найти выхода изъ лабиринта своихъ параллелограмовъ силъ. Предвзятымъ мнѣніемъ въ данномъ случаѣ служить, повторю, *вѣра* въ то, что всѣ силы, дѣйствующія въ природѣ, должны непремѣнно относиться къ типу центральныхъ.

\*\*) См. „Вѣстникъ Оп. Физики“ №№ 196 и 197.

чисто формальнымъ образомъ установленное различіе между *кинетической* и *потенциальной* энергию можно будетъ, до поры до времени, признавать цѣлесообразнымъ, но только съ *педагогической* точки зрењія, въ смыслѣ удобной условной терминологіи, облегчающей изложеніе ученія о законѣ сохраненія энергіи. Но по существу—это различіе въ физикѣ лишишее, какъ теряющее съ принятіемъ принципа пассивнаго взаимодѣйствія всякой конкретный смыслъ.

Хотя мы и не въ состояніи постичь самой сущности *энергии*, такъ же какъ и сущности *вещества*, но, если путемъ вѣковыхъ наблюдений и опытовъ мы пришли къ установлению такихъ двухъ капитальныхъ краеугольныхъ камней естествознанія, какъ законъ сохраненія вещества и законъ сохраненія энергіи, то уже въ силу этого мы не можемъ сомнѣваться въ томъ, что то, что мы считаемъ *энергию*, точно такъ же единственно по своей сущности, какъ и то, что мы считаемъ *веществомъ*, или *матерію*. Мы можемъ различать отдельные виды какъ энергіи такъ и вещества, но эти различія не касаются ихъ сущности, и никто, повидимому, не рискуетъ смѣшать какой нибудь видъ энергіи съ тѣмъ что не есть энергія, или какой нибудь видъ вещества съ тѣмъ, что не вещественно. Поэтому энергія *одна* и вещество *одно*, и дѣлить энергию на какую то энергию *въ потенціи*, и энергию *въ дѣйствіи*, такъ же нелогично, какъ напримѣръ дѣлить вещества на вещество *въ возможности* и вещество *въ дѣйствительности*.

Между тѣмъ такое именно дѣленіе энергію на энергию положенія и энергию движенія—общепринято. Въ этомъ, опять таки, нельзя не видѣть уступки, какую физика сдѣлала ради сохраненія въ свою пользу преимуществъ, доставляемыхъ ей рациональною механикою. Но—опять повторяю—необходима ли такая уступка, въ ущербъ здравому смыслу?

Я не только сомнѣваюсь въ этомъ, но даже увѣренъ, что подобнаго рода уступки дѣлаются нынѣ больше по привычкѣ, чѣмъ по необходимости, вслѣдствіе того что большинство современныхъ выдающихся физиковъ, воспитанныхъ на стройной системѣ рациональной механики, подъ стремительнымъ наплывомъ все новыхъ и новыхъ обогащающихъ физику фактовъ, не имѣютъ попросту времени придумать для ихъ динамического истолкованія новой, болѣе подходящей системы рациональной механики и предпочитаютъ пользоваться готовой, не взирая на то, что одинъ изъ ея основныхъ принциповъ (2-ой), какъ было указано выше, въ видѣ общаго принципа въ физикѣ неприложимъ.

Эр. Шпачинский.

(Продолженіе сlijдетъ).

# РЕЦЕНЗІИ.

θ. Н. Шведовъ. Методика физики. Выпускъ I. Введеніе. Одесса, 1894 г.,  
31 стр., цѣна 45 коп.

(Окончаніе \*).

„Источникомъ энергіи“ авторъ называетъ „тѣло, съ которымъ мы связываемъ существование дѣятеля“. Очевидно, онъ и самъ забылъ на этотъ разъ, что отнести къ дѣятелямъ и веществу, иначе трудно допустить, чтобы онъ хотѣлъ утверждать, будто источникомъ энергіи называется всякое материальное тѣло (т. е. тѣло, съ которымъ мы связываемъ существование вещества). А впрочемъ, можетъ быть авторъ хотѣлъ установить такимъ определеніемъ особый видъ материальной энергіи, источникомъ которой служитъ именно всякое тѣло, такъ какъ сейчасъ же послѣ этого онъ говоритъ, что „энергія получаетъ название соотвѣтственно дѣятелю, за исключеніемъ энергіи силовой, которая называется механической“. Ясно, что проф. Шведовъ лишь краткости ради умолчалъ о материальной энергіи, равноправной въ новой физикѣ съ энергией свѣтовой, тепловой, звуковой, вкусовой, пахучей и механической. Слѣдующая фраза, однаждъ, опять вводить на этотъ счетъ въ сомнѣніе: „натянутая пружина—говорить онъ—есть источникъ механической энергіи“. Можетъ быть авторъ хотѣлъ сказать, что „упругость натянутой пружины есть источникъ механической энергіи (а иногда—не механической, а звуковой), а сама пружина—источникъ материальной энергіи“.

Затѣмъ авторъ говоритъ о напряженіи и о количествѣ энергіи, не давая впрочемъ определеній этихъ терминовъ. Ранѣе однаждъ, (въ § 5), онъ упомянулъ, что нельзѧ въ физикѣ говорить: сила свѣта, сила звука, а надо говорить: напряженіе свѣта, напряженіе звука. Значитъ не только энергія дѣятелей, но и самые дѣятели имѣютъ напряженіе (вѣроятно, тоже и количество, ибо говорить же напр. количество теплоты, количество вещества). Если такъ, то надо же было разъяснить, какое различіе существуетъ между напряженіемъ свѣта и напряженіемъ свѣтовой энергіи, между количествомъ теплоты и количествомъ тепловой энергіи и пр.

Въ заключеніе разбора этого §, позволю себѣ спросить проф. Шведова,увѣренъ ли онъ, что не смѣшаль понятій о своихъ дѣятеляхъ съ понятіями обѣ ихъ энергіи? Я, по крайней мѣрѣ, не увѣренъ, ибо все, что имъ было сказано въ предыдущихъ §§ о свѣтѣ, звуки, теплотѣ, силѣ и веществѣ—какъ самостоятельныхъ физическихъ дѣятеляхъ—относилось скорѣе къ различнымъ видамъ энергіи: свѣтовой, звуковой, тепловой, механической и молекулярной.

Перехожу къ § 9, озаглавленному: „Классификація дѣятелей природы“. Разсказавъ о томъ, что въ природѣ есть такие дѣятели, „кото-

\*) См. „В. О. Ф.“ № 199.

рые производятъ множество объективныхъ эффектовъ и тѣмъ не менѣе не могутъ проявляться субъективно", авторъ перечисляетъ ихъ и находитъ только три: „химическое средство, способность кристаллизации и жизнь“ (!!!). Итакъ, господа, жизнь есть физический дѣятель, не способный проявляться субъективно, а только объективно! По отношенію къ жизни, къ химическому средству и кристаллизациі, мы находимся въ такомъ положеніи, какъ „глухой отъ рожденія, попавшій на представление оперы“. Очень жаль, что авторъ въ столь интересномъ мѣстѣ своей классификаціи ограничился лаконизмомъ оракула и не разъяснилъ намъ, съ новой точки зрењія на „жизнь“, что онъ понимаетъ послѣ этого вообще подъ *субъективнымъ* ощущеніемъ, если даже сознаніе жизни есть эффектъ объективный.—Строеніе тѣлъ твердыхъ аморфныхъ, жидкихъ и газообразныхъ, сцепленіе, прилипаніе, упругость, растворимость, электричество, магнетизмъ и пр. ипр.—все это не нуждается, по мнѣнію проф. Шведова, въ допущеніи вмѣшательства какихъ либо новыхъ дѣятелей, помимо ранѣе перечисленныхъ; нуждаются въ этомъ только способность образованія кристалловъ, химическое средство и жизнь. Такова классификація.

Въ § 10 физические дѣятели раздѣляются на двѣ группы: первая— „группа оттѣнковъ“, заключаетъ свѣтъ, звукъ, теплоту, вкусъ и запахъ; вторая—группа видовъ—заключаетъ силу и матерію“.

„*Оттѣнками* мы называемъ такія формы одного и того-же дѣятеля, которыя различаются нами субъективно“. „*Видами*— называемъ такія формы дѣятелей, для различенія которыхъ не существуетъ варіантовъ ощущенія и о существованіи которыхъ мы догадываемся по объективнымъ условіямъ“.

Для уясненія такого дѣленія, авторъ приводитъ примѣры: „тоны, тембры, шумъ, стукъ—суть оттѣнки звука“. (До сихъ порь *оттѣнкомъ* звука въ физикѣ называли только *тембръ*, различие же въ *тонахъ*—называли различіемъ въ *высотѣ звука*). „Цвѣта голубой, синій, зеленый, сѣрый и т. д.—суть оттѣнки свѣта, потому что для каждого изъ нихъ имѣемъ отдельное субъективное представление“. Все это прекрасно и довольно понятно. Но вотъ что непонятно: что такое оттѣнки теплоты? Если этотъ дѣятель отнесенъ авторомъ къ 1-ой группѣ, то необходимо было разъяснить на примѣрѣ, какое это оттѣнки теплоты „различаются нами субъективно“, такъ какъ читатель можетъ стать въ туницѣ, на томъ основаніи, что напр. теплота инфра-красныхъ лучей спектра и красныхъ вовсе не различаются имъ субъективно и онъ „догадывается о существовании разницы лишь по объективнымъ условіямъ“.

Авторъ умалчиваетъ также о томъ, что онъ понимаетъ подъ *видами* матеріи, хотя и отнесъ этотъ дѣятель ко 2-ой группѣ. По всей вѣроятности виды матеріи обусловливаются ея химическимъ составомъ. Если такъ, то относится ли изученіе вещества по видамъ къ физикѣ или нѣтъ? Вѣдь въ § 3 авторъ говоритъ, что „въ призрачности рубежа, отдѣляющаго физику отъ химіи, слѣдуетъ сомнѣваться“ и что нельзя давать такого опредѣленія физики, которое вынуждало бы отнести къ ея области „свойства химической реакціи“. Если же изученіе матеріи по видамъ должно быть отнесенено не къ физикѣ, а къ химіи, то въ физику вторая группа состоитъ не изъ двухъ дѣятелей, а толь-

ко изъ одного—силы, ибо только сила подлежитъ изученію по видамъ. Матерія же должна, стало быть, образовать особую 3-ью группу такихъ дѣятелей, которые въ физикѣ не различаются ни по оттѣнкамъ, ни по видамъ. Итакъ, классификація дѣятелей привела къ тремъ группамъ: двѣ изъ нихъ заключаютъ по одному дѣятелю, а къ третьей — одинъ изъ дѣятелей причисленъ по ошибкѣ. Куда же его отнести этого дѣятеля (теплоту)? Неужели для него придется создавать новую 4-ую группу?—Очень оригинальныя группы.

Четыре слѣдующіе §§ (11, 12, 13 и 14) посвящены выясненію значенія общей догмы физики, ея эволюціи и происхожденія. Вмѣсто того, чтобы опредѣлить догму какъ то основное положеніе (постулатъ), которое принимается нами условно на основаніи довѣрія къ нашимъ чувствамъ или къ логичности нашихъ умозрительныхъ выводовъ, авторъ даетъ другое опредѣленіе, нѣсколько туманное. Но это не важно и указанные §§ могли бы представить интересъ для читателя, если бы были разработаны обстоятельнѣе и, что важнѣе всего, безъ предвзятаго желанія связать ихъ съ прежними, не выдерживающими никакой критики. Классификація дѣятелей, о достоинствѣ которой мы только что говорили, такъ нравится автору, что, не желая видѣть всей ея несостоятельности, онъ кладетъ ее въ основу разсужденій о происхожденіи догмы. Если за базисъ для установленія современной матеріалистической догмы въ физикѣ принимаются *сила* и *матерія*, то это потому—по мнѣнію проф. Шведова—что эти два и только эти два дѣятеля „обладаютъ неразложимостью“.—„Мы понимаемъ — говорить онъ (§ 13)—свѣтъ какъ нѣчто сложное, распадающееся на цвѣта: зеленый, синій и т. д. Звукъ распадается на тоны, тембры; запахъ на множество оттѣнковъ: запахъ розы, фіалки и т. д. Неразложимостью обладаютъ только два рода ощущенія: *усиліе* и *осязаніе*“. Во 1-хъ—это совершенно вѣрно, ибо всѣ наши ощущенія субъективно неразложимы, и подобному какъ, осязая пальцами какое нибудь тѣло, мы не можемъ составить себѣ представленія объ его химическомъ составѣ, точно такъ не можемъ мы глазомъ разлагать на составныя части свѣтовыхъ ощущеній, ухомъ—звуковыхъ. Природа не надѣлила настъ анализаторами. Какъ для химического анализа нужны реторты, реактивы и пр., такъ для свѣтового нужна намъ въ пособіе призма, для звукового—резонаторы и т. д. Возводить поэтому неразложимость осязанія въ какое то исключеніе—попросту смѣшно. Во 2-хъ, почему же авторъ умышленно умалчиваетъ о многихъ другихъ неразложимыхъ ощущеніяхъ, какъ, напр., ощущеніе голода, жажды, жара и пр.?—Оставивъ даже голодъ, жажду и пр. въ сторонѣ, не слѣдовало по крайней мѣрѣ умалчивать объ ощущеніи жара, соотвѣтствующемъ такому важному физическому дѣятелю какъ теплота, и надо было доказать, что это ощущеніе разлагается нами тоже на составныя части.

Мимоходомъ авторъ открываетъ еще здѣсь *новый законъ* природы. Пришомнивъ кстати, что органы *усилія* и *осязанія* суть именно тѣ, „которые наиболѣе приспособлены къ доставленію намъ представленія о пространствѣ“(?), онъ говоритъ, что „природа, надѣляя органъ чувствительностью, какъ бы старалась компенсировать недостатокъ одного качества другимъ, и надѣлила органъ чувствительностью къ распознаванію оттѣнковъ физического дѣятеля тѣмъ болѣе, чѣмъ менѣе этотъ

органъ приспособленъ къ оцѣнкѣ пространственныхъ свойствъ дѣятеля". Изъ этого замѣчательного закона проф. Шведова слѣдуетъ, что наше зрѣніе въ гораздо меньшей степени приспособлено къ оцѣнкѣ пространственныхъ соотношений, нежели наша кожа (т. е. органъ осозанія и ощущенія жара).

Въ § 15 опять перепутываются понятія о дѣятеляхъ и ихъ энергіи. Здѣсь говорится, что единственныя измѣненія, коимъ можетъ подвергаться всякий физическій элементъ (т. е. оттѣнокъ или видъ дѣятеля) относятся только къ его распределенію въ пространствѣ и къ количеству его энергіи. А куда же дѣвалось *напряженіе* энергіи? Всльдъ за симъ идетъ рѣчь о взаимодѣйствіи между энергіями дѣятелей; а развѣ такое взаимодѣйствіе (напр. 4-ый случай автора—*"увеличеніе* энергіи одного дѣятеля сопровождается уменьшеніемъ энергіи другого") обусловливается различiemъ въ *количествѣ*, а не въ *напряженіи* энергіи? Но допустимъ, что это пропускъ или описка. Что же авторъ желить понимать напр. подъ энергіею куска стекла (т. е. одного изъ видовъ вещества"). Въ числѣ выдуманныхъ имъ основныхъ *принциповъ* или *началъ* физики, второе названо *"началомъ геометрической зависимости физическихъ энергій другъ отъ друга"*, и для поясненія этого довольно туманнаго принципа приведенъ примѣръ отраженія и преломленія свѣта. Выходитъ, слѣдовательно, что геометрическое измѣненіе энергіи лучей свѣта произошло *"подъ вліяніемъ"* энергіи, напр., куска стекла. Что же это за стекляная энергія? Если это *молекулярная* энергія, то почему же авторъ умалчивалъ о ней до сихъ поръ? Вѣдь раньше онъ говорилъ, и особенно на томъ настаивалъ, что наше осознаніе дѣйствуетъ не молекулярная энергія вещества, а само вещество. Что же теперь дѣйствуетъ на свѣтѣ: кусокъ стекла или его молекулярная энергія?

Для поясненія первого своего принципа, названнаго *"началомъ полной независимости физическихъ энергій"*, приводится, какъ примѣръ, сложеніе силъ. Это называлось до сихъ поръ *"принципомъ независимости дѣйствія силъ"*, а не энергій. Развѣ по мнѣнію автора—это все равно?

Вообще, надо сказать, автору не повезло съ введеніемъ въ свою философію понятія объ энергіи. Причину такой неудачи я усматриваю въ томъ, что онъ не язвенно различаетъ — какъ уже было сказано раньше — энергіи своихъ дѣятелей отъ нихъ самихъ, и, въ томъ, что избѣгая общепринятыхъ опредѣленій, желалъ блеснуть оригинальностью и слишкомъ увлекся своей классификациею, не позабывши о выясненіи ни ея основъ, ни надобности.

Въ разобранныхъ выше 15 §§ заканчивается, къ счастію, философская часть новой *"Методики физики"*; въ § 16-мъ авторъ находитъ, что *"логическая основанія для выбора материала физики"* уже выяснены, и переходитъ къ дидактике, раздѣливъ ея задачу на двѣ части: 1) *"сравнительную оцѣнку методъ или способовъ изложенія съ точки зрѣнія ихъ содѣйствія къ наиболѣе легкому и прочному усвоенію предмета учащимися"* и 2) *"выработку плана преподаванія, т. е. распре-*

дѣленіе матеріяла науки на отдельныя группы и указаніе послѣдовательности этихъ группъ въ общемъ ходѣ обученія".

Можно лишь пожалѣть, что проф. Шведовъ не приступилъ въ брошюру сразу къ разбору методовъ и плановъ преподаванія физики, а предпочтѣлъ предположить ему столь оригинально изложенную доктринальную часть методики. Эта доктринальная во 1-хъ (занимающая большую половину брошюры) подрываетъ только довѣріе читателя къ автору, мнѣніе котораго, какъ физика и заслуженнаго профессора, въ затрагиваемомъ вопросѣ должно имѣть вѣсъ. Съ этимъ мнѣніемъ, высказаннымъ ясно и опредѣленно во второй половинѣ "Введенія", можно соглашаться либо нѣтъ, можно—въ послѣднемъ случаѣ—высказать тѣ либо другія возраженія, но надѣ этимъ мнѣніемъ нельзѧ смыться... Во 2-хъ, я готовъ сдѣлать предположеніе—если бы авторъ началъ прямо свою брошюру съ § 16, онъ вѣроятно развили бы вполнѣ свою мысль о необходимости дѣлить гимназическій курсъ физики на концентры, и—во всякомъ случаѣ—не скомпрометировали бы этой мысли, заслуживающей—повторяю—вполнѣ серьезнаго къ ней отношенія, всѣмъ тѣмъ, что было имѣть такъ необдуманно высказано въ первыхъ 15-и §§ и что, по неволѣ, должно связываться въ умѣ читателя съ планомъ концентровъ, хотя, по существу, никакой связи съ ними, конечно, имѣть не должно.

Съ такой точки зрѣнія позволяю себѣ высказать кое какія замѣчанія по поводу второй части рассматриваемой брошюры.

1. Не знаю былъ ли когда либо проф. Шведовъ *учителемъ* физики въ низшемъ чѣмъ университѣтъ учебномъ заведеніи. Думаю, однако, что нѣтъ; иначе паврядъ ли онъ рѣшился бы сказать слѣдующую фразу: „Нужно принять за несомнѣнныи фактъ, что *каждый* юноша живо интересуется природой, болѣе, чѣмъ какимъ бы ни было другимъ предметомъ“ (§ 17).

Педагогическій *опытъ*, вообще говоря, не даетъ права считать это положеніе за фактъ, какъ бы оно ни было удобно для нашихъ дальниѣшихъ доказательствъ. Напротивъ, скорѣе можно сказать, что не только дѣти, но и юноши, не только девочки, но и мальчики интересуются сами по себѣ *меньше всего* именно природою и ея законами. Физикою, какъ натуральною философией, начинаютъ интересоваться лишь въ зрѣломъ возрастѣ. Устраивать, забавы ради, электрические звонки для домашняго обихода, или помогать учителю физики въ мелкой починкѣ кабинетныхъ приборовъ—еще не значитъ интересоваться физикою. Сколько мнѣ известно, исторія физики не даетъ *ни одного* имени малолѣтки, проявившаго уже въ дѣствѣ особенные наклонности къ этой наукѣ и способности, между тѣмъ какъ въ области художествъ и другихъ наукъ, какъ напр. филологическихъ и даже математическихъ, примѣровъ такихъ специальныхъ наклонностей имѣется достаточно. Въ виду всего этого, я думаю, что предполагать въ юношахъ, приступающихъ къ изученію физики „живой интересъ“ къ изученію явлений природы было бы крупною педагогическою ошибкою, и что—напротивъ того—отсутствиемъ этого интереса и высокой трудностью вызвать его въ молодые годы, обусловливается въ наибольшей мѣрѣ малоуспѣшность учениковъ по физикѣ.

2. При сравнительной оценке методов изложения физики проф. Шведовъ находитъ возможнымъ (см. выше) принять, какъ точку зрения „содѣйствіе ихъ къ наиболѣе лѣкому и прочному“ (курсивъ нашъ) усвоенію предмета“. Развѣ это совмѣстимо? На мой взглядъ—нѣтъ. Что либо одно изъ двухъ—или будемъ имѣть въ виду лѣкость усвоенія, или прочность. Наименѣе надежныя знанія суть тѣ, которыя легко даются. Это педагогическая аксиома, и авторъ напрасно, приведя словами Евтушевскаго панегирикъ „катихитическому“ методу преподаванія математики, считаетъ его такимъ цѣннымъ и высказываетъ сожалѣнія, что онъ непримѣнимъ къ физикѣ. Слѣдовало бы скрѣе радоваться, а не жалѣть, ибо приверженцы этого метода именно гонялись за легкостью и привнесли ей въ жертву прочность и научность усвоенія.

3. Исходя изъ положенія, что память проявляется раньше другихъ способностей, воображеніе развивается позже, на счетъ памяти, и еще позже зарождается соображеніе, проф. Шведовъ полагаетъ, что „въ силу сказанного, преподаваніе физики должно распадаться на три послѣдовательныхъ періода. Въ первомъ, опираясь преимущественно на память, слѣдуетъ заботиться о расширѣніи круга фактическихъ свѣдѣній ученика путемъ конкретнаго изученія природы. Во второмъ—слѣдуетъ пользоваться преимущественно воображеніемъ; въ третьемъ—соображеніемъ“. Вотъ основная идея концентровъ, центръ тяжести всей „Методики“ автора. Развивая эту идею подробнѣе, онъ устанавливаетъ слѣдующія основныя правила: 1) „на первой стадіи прохожденія физики годится метода только эвристическая“, 2) „во второмъ періодѣ изложенія физики годится метода только догматическая“ и 3) въ третьемъ (послѣднемъ) періодѣ наиболѣе подходящею методою является историческая.

Такую систему, быть можетъ, и можно было бы признать цѣлесообразною съ педагогической точки зрения, не смотря даже на видимую ея искусственность, если бы курсъ элементарной физики продолжался не 3 года, а 8 или 7 лѣтъ, т. е. если бы онъ начинался не въ высшихъ, а въ низшихъ классахъ гимназій и реальныхъ училищъ. Мнѣ кажется, что наврядъ ли ктонибудь согласится съ авторомъ, будто гимназисты VI-го класса, приступающіе къ изученію физики, находятся еще въ томъ возрастѣ, когда умственныя способности даютъ право разсчитывать лишь на ихъ память, будто воображеніе не можетъ развиться раньше перехода въ VII-ой классъ, и соображеніе—раньше перехода въ VIII-ой. Если же такой градациіи способностей по классамъ не существуетъ, то и вышеуказанное распределеніе методовъ эвристического, догматического и исторического въ послѣдовательномъ порядке ихъ примѣненія въ гимназическомъ курсѣ физикѣ, теряетъ свое *raison d'être*, и вмѣстѣ съ тѣмъ, основная идея „концентровъ“—свою главную точку опоры.

4. Притомъ самъ авторъ, повидимому, не можетъ придать своей системѣ всей желательной стройности, и впадаетъ какъ будто въ противорѣчие. Такъ, напр., разъясняя сущность эвристического метода, онъ говоритъ: „Здѣсь, какъ въ катихитической методѣ, урокъ принимаетъ форму оживленнаго діалога между учителемъ и классомъ. Но здѣсь вопросы раздѣляются на двѣ категоріи. Въ первой—учитель обращается

къ памяти (курсивъ автора) учениковъ и предлагаетъ имъ воспроизвести словами или описать то, что они только что видѣли; во второй—къ ихъ *соображенію* (курсивъ нашъ), т. е. къ способности изъ наблюденныхъ фактовъ вывести свои *заключенія*” (§ 17). Но мы видѣли, что въ дальнѣйшемъ (§ 18) методъ эвристической рекомендуется для первого концентра, соответствующаго тому возрасту, когда *соображенія* еще нѣтъ, а есть лишь *память*. Очевидно, что нибудь одно изъ двухъ: либо нельзя примѣнять этого метода на первой стадіи прохожденія физики, либо при эвристическомъ методѣ преподаванія незачѣмъ разсчитывать на способность учащихся къ *соображенію*.

5. Непонятнымъ кажется мнѣ также выдѣленіе въ третій и послѣдній концентръ, „когда преподаватель долженъ привлечь къ дѣятельности высшую умственную способность ученика—соображеніе”,—всего того изъ обычного курса, что составляетъ область практической или технической физики, а именно описанія „паровыхъ машинъ, динамомашинъ, телеграфовъ, телефоновъ, телескоповъ, физическихъ инструментовъ, искусства фотографіи, гальванопластики и пр.“. Неужели эта именно часть курса элементарной физики должна быть признана наиболѣе трудною и требующею „привлеченія къ дѣятельности высшей умственной способности”? Столь же непонятно, (если даже не болѣе), почему авторъ только къ этому отдалу рекомендуеть примѣнять исторический методъ изложенія, считая, очевидно, поучительнымъ лишь *исторію изобрѣтеній* и лишая исторію открытій и установлениія научныхъ принциповъ всякаго педагогического значенія.

Во всемъ этомъ опять таки нельзя не замѣтить нѣкотораго противорѣчія. Говоря о примѣненіи эвристического метода, авторъ вполнѣ основательно замѣчаетъ: „первые шаги учителя должны быть направлены къ раскрытию внутренняго міра ученика, т. е. того взгляда на явленія природы, который таится въ умѣ ученика въ неявномъ, скрытомъ видѣ. А этого можно достигнуть съ полной опредѣленностью только путемъ діалога между учителемъ и классомъ на тему о предметахъ, находящихся на-лицо или же припоминаемыхъ изъ ежедневной практики“. Но если ученики, не изучавши еще физики на урокахъ, имѣютъ какія либо о ней свѣдѣнія, то таковыя именно относятся не къ теоретической, а къ практической области; если ихъ раньше что либо интересовало изъ физики, то конечно не вопросы о томъ напр., что такое вещество, сила и пр., а скорѣе какіе нибудь фонографы, гальванические элементы, телефоны, электрическія лампочки и пр., съ которыми они познакомились поверхностно въ ежедневной жизни. Слѣдовательно, если учитель располагаетъ временемъ на „раскрытие внутренняго міра ученика“ путемъ объяснительныхъ бесѣдъ „на темы о предметахъ изъ ежедневной практики“, ему нельзя будетъ отвѣтить молчаніемъ на вопросы, касающіеся тѣхъ именно „объектовъ знанія“ изъ области физической техники, которые, по мнѣнию проф. Шведова, только „нарушаютъ гармонію“ научнаго курса физики и потому выдѣлены имъ въ особый третій концентръ. Мне думается, что эвристический методъ, разъ преподаватель рѣшилъ къ нему прибѣгнуть, окажаль-бы весьма жалкое вліяніе на развитіе въ учащихся охоты къ постиженію явленій природы, если бы на всякий почти предлагаемый ученикомъ вопросъ, каса-

тельно того, что его заинтересовало, приходилось ждать отвѣта п'ѣлыхъ два года. Если же допустить возможность включить въ первый концентръ, (который авторъ неявно называетъ періодомъ „совершенного исключенія учебника, записокъ и пр.“ изъ преподавательской практики) діалоги о различныхъ физическихъ приборахъ, телефонахъ, фотографіяхъ и пр., то за что же—спрашивается — эти „нарушающіе гармонію объекты знанія“ удостаиваются чести вторичнаго изложенія въ третьемъ концентрѣ, съ историческими комментаріями вдобавокъ, въ то время, какъ трехлѣтній срокъ, предназначенный для прохожденія всей физики, оказывается нынѣ столь краткимъ, что приходится о нѣкоторыхъ от-дѣлахъ и вовсе умалчивать за недостаткомъ времени?

6. Примѣры, выбранные проф. Шведовымъ для наглядной иллюстрації преимуществъ „концентрическаго“ плана по сравненію съ „радіальнымъ“ нельзя назвать удачными, потому что онъ останавливается лишь на *географіи* и *аріометрикѣ*, т. е. на такихъ предметахъ, которыхъ преподаваніе начинается съ 1-го, т. е. низшаго класса учебныхъ заведеній. Никто и не сомнѣвается, что *при такомъ условіи* приводимое авторомъ дѣленіе курса ариометрии по радіальному плану на четыре района (сложеніе, вычитаніе, умноженіе и дѣленіе) было бы педагогическою нелѣпостью. Но развѣ такое *reductio ad absurdum* примѣнено въ данномъ случаѣ къ доказательству *необходимости* дѣлить концентрически, а не радіально, курсъ физики, т. е. курсъ такого предмета, котораго преподаваніе начинается не съ 1-го, а съ 6-го класса (въ гимназіяхъ и съ 5-го въ реальныхъ училищахъ)? Если авторъ хотѣлъ упираться на аналогіи, надлежало выбрать примѣры подходящіе. Такъ напр. слѣдовало для сравненія взять не ариометрику, а геометрію, которая начинается съ 4-го класса, и показать, что и для этого предмета было бы цѣлесообразнѣе расположить его курсъ концентрически, а не радіально, т. е. надо было защищать всѣми лучшими педагогами оставленную нынѣ идею о необходимости предварительной *пропедевтики* геометріи. Тогда, по крайней мѣрѣ, видна была бы послѣдовательность.

На основаніи всего изложеннаго въ этой, быть можетъ, слишкомъ пространной рецензії, я не нахожу достаточныхъ основаній согласиться съ проф. Шведовымъ, будто изложеніе физики въ средне-учебныхъ заведеніяхъ по „чудовищному“ радіальному плану (принятыму, въ скобкахъ будь сказано, во *всемъ цивилизованномъ мірѣ*) представляетъ столь „ужасающей фактъ“. Я далекъ отъ мысли защищать нынѣ принятую въ гимназіяхъ систему изложения физики, и не имѣю никакого намѣренія вдаваться здѣсь въ препирательство о преимуществахъ „радіального“ плана преподаванія. Мне хотѣлось только показать, что во 1-хъ, основы догматической части предпринятой проф. Шведовымъ методики физики приводятъ къ столь явнымъ противорѣчіямъ и неудобствамъ, что о принятіи ихъ будущими составителями учебниковъ и преподавателями не можетъ быть и рѣчи, и во 2-хъ, что соображенія, высказанныя въ 2-ой части разсматриваемой брошюры о необходимости реформировать курсъ элементарной физики по концентрическому плану, оставляютъ такъ много места возраженіямъ и сомнѣніямъ, что признать за ними убѣдительность доказательства не въ состояніи никто, кто можетъ и желаетъ отнестишь къ затронутому вопросу вполнѣ объективно.

Въ заключеніе позволю себѣ выразить надежду, что въ дальнѣйшихъ выпускахъ своей „Методики“, появленія коихъ многіе, вѣроятно, ожидаются съ нетерпѣніемъ, авторъ позаботится „намѣтить логическая основанія“ для проектируемой имъ реформы съ большею нежели до сихъ поръ строгостью.

Безличный.

## НАУЧНАЯ ХРОНИКА.

**Металлический хромъ** до послѣдняго времени оставался совершенно неизученнымъ, такъ какъ не существовало способовъ полученія значительныхъ его количествъ въ чистомъ видѣ: онъ получался обыкновенно въ видѣ сплава съ желѣзомъ, содержащаго значительное количество углерода. Въ настоящее время извѣстный французскій химикъ Moissan, сплавляя въ своей электрической печи, о которой уже неоднократно говорилось въ „Вѣстнике“\*), окись хрома, помѣщенную въ угольныя трубы, добылъ чистый хромъ въ значительномъ количествѣ (Парижской Академіи Наукъ онъ демонстрировалъ кусокъ хрома въ 20 килограммовъ) и изучилъ его физическія и химическія свойства.

Чистый хромъ представляетъ блестящій металлъ, легко полирующейся и обрабатываемый напильникомъ. Его удѣльный вѣсъ при 20° равенъ 6,92; его температура плавленія лежитъ выше температуры плавленія платины. Сплавленный въ электрической печи, онъ представляетъ удобоподвижную жидкость, сходную со ртутью; онъ не дѣйствуетъ на магнитную стрѣлку и едва чертитъ стекло. Во влажномъ воздухѣ черезъ нѣсколько дней его поверхность становится матовой, но это окисленіе не распространяется въ толщу металла. Нагрѣтый до 2000° въ кислородѣ, онъ сгораетъ, разбрасывая многочисленныя блестящія искры. Хромовая опилка соединяется при 700° съ сѣрой. Изъ сплавовъ хрома особенно интересенъ сплавъ его съ мѣдью, способный хорошо полироваться и болѣе устойчивый во влажномъ воздухѣ, нежели чистая мѣдь.

Изучая тѣ условия, при которыхъ хромъ получается въ наиболѣе чистомъ видѣ, Moissan открылъ два соединенія хрома съ углеродомъ, состава  $C_2Cr_3$  и  $CCr_4$ . На первое изъ нихъ, имѣющее плотность 5,62, не дѣйствуютъ ни крѣпкая соляная кислота, ни дымящаяся азотная, ни царская водка: дѣйствуетъ лишь разбавленная соляная кислота. Второе ( $CCr_4$ ) кристаллизуется въ длинныхъ иглахъ и имѣть плотность 6,75. Кромѣ этихъ двухъ соединеній, полученъ еще хромъ съ 1,5 — 1,9% углерода, кристаллизующійся въ небольшихъ кубахъ и октаэдрахъ.

По всей вѣроятности техника обратитъ вниманіе на новый металлъ и на его сплавы, обладающіе столь драгоценными свойствами (C. R.).

B. Г.

\*) См. „Вѣстникъ Оп. Физики“, № 157, стр. 19, № 161, стр. 99.

**Новая составная часть воздуха.** Въ химической секції Британской Ассоціаціи, собирающейся въ этомъ году въ Оксфордѣ, извѣстные английские химики лордъ Rayleigh и Ramsay сдѣлали весьма интересное сообщеніе о совершенно неожиданномъ открытии новой составной части воздуха. Лордъ Rayleigh занимался въ продолженіи цѣлаго ряда лѣтъ опредѣленіями плотностей различныхъ газовъ. При этихъ изслѣдованияхъ онъ замѣтилъ, что для плотности азота получаются значительныя колебанія, доходящія до 0,5%, въ зависимости отъ того, былъ ли полученъ изслѣдованный газъ изъ химического соединенія, или изъ воздуха. Заинтересовавшись этимъ обстоятельствомъ, лордъ Rayleigh вмѣстѣ съ Ramsay'емъ сталъ искать его причины и имъ удалось двумя различными способами отфильтровать отъ атмосферного азота второе индифферентное химическое вещество, которое значительно плотнѣе азота. Первый изъ примѣненныхъ двухъ способовъ заключается въ слѣдующемъ: черезъ смѣшанный съ кислородомъ воздухъ пропускается рядъ электрическихъ искръ. Азотъ при этомъ окисляется и конечный продуктъ такого окисленія,—азотная кислота,—поглощается щелочью. Пропусканіе искръ продолжается до тѣхъ поръ, пока объемъ газовъ не перестанетъ уменьшаться. Оставшійся избытокъ кислорода поглощаются нирогалломъ. Послѣ этого остается еще нѣкоторое количество газа, спектръ котораго отличается отъ спектра азота. По второму способу, который доставилъ значительное количество нового газа, лишенный кислорода воздухъ пропускался надъ нагрѣтой магнезіей. Если продолжать такое пропусканіе достаточно долго, то плотность газа постепенно увеличивается до 19,09 (плотность азота по F. W. Clarke'у равна 14,03). При дальнѣйшемъ пропусканіи газа поглощенія повидимому не происходило. Остается непоглощеннымъ приблизительно 1% взятаго первоначально атмосферного азота. Смѣшивая полученный такимъ образомъ газъ съ кислородомъ и пропуская черезъ смѣсь электрическія искры, авторы не замѣтили уменьшенія объема смѣси. Подвергая новый газъ сильному давленію при обыкновенной температурѣ, авторы не могли обратить его въ жидкость.

По поводу этого открытия, сильно заинтересовавшаго не только химиковъ, James Dewar, весьма извѣстный физикъ и химикъ, опубликовалъ въ лондонской газетѣ „Times“ два письма. Въ первомъ изъ нихъ (отъ 16 августа) онъ указываетъ на то, что были и прежде нѣкоторыя указанія на присутствіе въ воздухѣ неизученной еще составной части. Если, именно, охладить воздухъ до — 200°, то онъ сгущается въ жидкость; жидкость эта всегда получается болѣе или менѣе мутной, что обусловливается присутствиемъ въ ней затвердѣвшей углекислоты и другихъ примѣсей воздуха. Но какъ бы тщательно ни очищать до сгущенія воздухъ отъ его примѣсей—бѣлое твердое вещество всегда наблюдается въ жидкости. Поэтому, если только новое вещество кипитъ при болѣе высокой температурѣ, чѣмъ кислородъ и азотъ, то его можно отфильтровать отъ нихъ дробной перегонкой сгущенного воздуха. Во второмъ письмѣ (отъ 18 августа) Dewar высказываетъ не лишенное основаній предположеніе, что новое вещество есть аллотропическое видоизмененіе азота. Если это такъ, то плотность его есть вѣроятно не 19, какъ нашли Rayleigh и Ramsay, а 21, т. е. частица его, какъ и ча-

стица озона, состоит изъ трехъ атомовъ. Весьма можетъ быть также, что въ атмосфѣрѣ это аллотропическое соединеніе азота содержится въ самомъ ничтожномъ количествѣ и образуется при пропусканиі искръ черезъ смѣсь атмосфернаго азота съ кислородомъ или при пропусканиі атмосфернаго азота надъ магнезией.

Новые наблюденія, конечно, разъяснятъ этотъ вопросъ, но открытие Rayleigh'я и Ramsay'я не потеряетъ своего интереса, если-бы даже и оказалось, что въ атмосфѣрѣ открытое ими вещество почти не содержится, ибо аллотропическое видоизмененіе азота давно уже отыскивалось химиками, но безуспѣшно.

B. Г.

## РАЗНЫЯ ИЗВѢСТИЯ.

❖ Новый фотографический журналъ подъ названіемъ: „Русскій фотографический журналъ“ разрѣшено издавать сверхштатному ассистенту Императорской военно-медицинской академіи Е. П. Головину. Журналъ этотъ будетъ выходить въ Петербургѣ ежемѣсячно по слѣдующей программѣ:

- 1) Оригинальныя, компилиативныя и переводныя статьи по фотофизикѣ и фотохимії.
- 2) Успѣхи фотографіи въ Россіи и за границею.
- 3) Производство и добываніе веществъ, примѣняемыхъ въ фотографіи.
- 4) Устройство и выдѣлка инструментовъ и приборовъ, употребляемыхъ въ фотографіи и ея примѣненіяхъ, и провѣрка ихъ годности.
- 5) Примѣненіе фотографіи въ наукахъ, графическихъ искусствахъ, военномъ дѣлѣ, на судѣ и проч.
- 6) Исторія фотографіи.
- 7) Обзоръ фотографической журналистики и сочиненій, относящихся до свѣтописи и вспомогательныхъ ея искусствъ.
- 9) Извѣстія о засѣданіяхъ фотографическихъ обществъ, выставкахъ и привилегіяхъ.
- 10) Критика и библіографія книгъ, касающихся фотографіи.
- 11) Смѣсь: сообщенія, касающіяся фотографіи.
- 12) Отвѣты редакціи.
- 13) Рисунки, чертежи и таблицы, поясняющіе текстъ.
- 14) Иллюстраціи, изображающія работы русскихъ и иностранныхъ фотографовъ и демонстрирующія различные способы фотографического искусства.
- 15) Объявленія.
- 16) Приложенія, въ которыхъ будутъ даваться отдѣльныя сочиненія по фотографіи.

Подписанная цѣна безъ доставки 4 р. въ годъ, съ пересылкой 5 р. въ годъ.

❖ Скончался академикъ Чебышевъ.

## ДОСТАВЛЕННЫЯ ВЪ РЕДАКЦІЮ КНИГИ ИЗБРОШЮРЫ.

**Краски и живопись.** Пособіе для художниковъ и техниковъ. **Ф. Петрушевская.** Спб. 1891. Ц. 2 р. 25 к.

**Празднованіе Императорскимъ Казанскимъ университетомъ столѣтней годовщины дня рождения Н. И. Лобачевского.** 1793—1893. Казань. 1894.

**Новѣйшая русско-немецкая азбука** для обученія въ 1 мѣсяцъ немецкому чтенію, письму и разговору, съ образцами письма и съ картинками. *Плято ф. Рейсснера.* 7-ое изданіе. Варшава. 1894. Ц. 10 к.

**Опытъ изслѣдованія физическихъ свойствъ Хаджибейского лимана, его рапы и грязи.** В. В. Филипповича, Старшаго Врача Общества попеченія о больныхъ дѣтяхъ г. Одессы. Изданіе ко дню столѣтія г. Одессы (1794—1894) съ приложеніемъ карты Хаджибейского лимана. Одесса. 1894. Складъ изданія у д-ра В. Филипповича (Екатерининская площасть, д. Ждановой). Цѣна 60 к.

**Физические свойства кадміевыхъ амальгамъ.** П. Бахметьевъ. Спб. 1894.

**Электрические токи просачиванія.** П. Бахметьевъ и Н. Пенчева. Спб. 1894.

**Спискъ на научнитѣ статии отъ Порфирий Ив. Бахметьевъ,** редовенъ прѣподаватель по физика въ Высшето Училище въ Софии, дѣйствителенъ членъ на Русското Физико-Химическо Общество въ С.-Петербургъ, членъ кореспондентъ на Физическото Общество въ Цюрихъ.

**Общедоступное землемѣріе.** Популярное изложеніе элементарныхъ геодезическихъ задачъ, решаемыхъ съ помощью только одной веревки или веревки и экера домашняго приготовленія. Составилъ Д. А. Колтановский. Съ 274 чертежами и планами въ текстѣ. Изданіе второе исправленное и дополненное Ф. Павленкова. Спб. 1894. Ц. 75.

## ЗАДАЧИ НА ИСПЫТАНИЯХЪ ЗРѢЛОСТИ ВЪ 18<sup>93/94</sup> Г.

*Одесскій Учебный Округъ.*

**Гимназіи:**

**Екатеринославская.**

1) **Алгебра:** Рѣшить въ цѣлыхъ и положительныхъ числахъ неопределеннное уравненіе:  $ax + by = c$ , въ которомъ  $a$  равно меньшему,  $b$  — большему корню слѣдующаго уравненія:  $2^{x^2} + 10 = 128^x$ ; а  $c$  равно числу рублей капитала, который, будучи отданъ въ ростъ по  $6\frac{1}{2}$  сложныхъ процентовъ, черезъ 50 лѣтъ обратится въ сумму 396 р. 24 к.

2) **Геометрія:** Изъ точки А окружности круга радиуса  $r$  проведены: диаметръ АВ и хорда АС подъ угломъ  $\alpha$  къ диаметру. Определить площадь круга, касающагося данного круга въ точкѣ В и данной хорды.

**Елисаветградская.**

1) **Алгебра:** Имѣется двухъ сортовъ чай, изъ которыхъ требуется составить смѣсь цѣною въ 3,6 руб. за фунтъ. Цѣны обоихъ сортовъ чая (выраженные въ рубляхъ) равны корнямъ уравненія  $x = \frac{3(5x - 9)}{2x}$ . Определить, сколько должно взять каждого сорта (въ цѣлыхъ числахъ) для составленія смѣси.

2) *Геометрія:* Данна правильнаа треугольнаа пирамида, грани ко-  
торой съ основаніемъ ея составляютъ уголъ  $\beta = 18^{\circ}45'40''$ , разность же  
между апоемои пирамиды и апоемои основанія  $(a - c) = m = 1,922$ .  
Опредѣлить объемъ данной пирамиды и отношение площаи основанія  
къ площаи съченія данной пирамиды плоскостью, проведеною черезъ  
сторону основанія и составляющею съ основаніемъ уголъ  $\alpha = 10^{\circ}30'20''$ .

### Керченская.

1) *Алгебра:* Найти такое число, которое при дѣленіи на 43 даетъ  
въ остатокъ  $1/324$ , а при дѣленіи на 18 даетъ въ остатокъ столько же единицъ,  
сколько членовъ въ ариѳметической прогрессіи, у которой третій  
членъ = 8, седьмой = 20, а сумма всѣхъ членовъ = 155.

2) *Геометрія:* Въ основаніи четыреугольной пирамиды лежитъ  
трапеція, у которой меньшая изъ параллельныхъ сторонъ = 125,2 д. и  
образуетъ съ одною изъ боковыхъ сторонъ уголъ въ  $90^{\circ}$ , а съ другою—  
 $132^{\circ}12'12''$ ; при этомъ та изъ непараллельныхъ сторонъ трапеціи, кото-  
рая больше другой, = 250,4, а высота пирамиды = высотъ трапеціи.  
Опредѣлить объемъ пирамиды.

### Кишиневская 1-ая.

1) *Алгебра:* Послѣ смерти отца остался капиталъ въ 80000 руб.,  
приносящій  $4\frac{1}{2}\%$ . На воспитаніе дѣтей тратили ежегодно 5000 руб.  
и остатокъ капитала черезъ 8 лѣтъ раздѣлили между двумя сыновьями  
и дочерью такъ, что дочь получила въ 7 разъ меньше, чѣмъ каждый  
сынъ. Сколько получили каждый сынъ и дочь?

2) *Геометрія:* Въ правильной девятиугольной пирамидѣ плоскій  
уголъ при вершинѣ  $20^{\circ}$ , а вся поверхность ея 3548 кв. центим. Тре-  
буется вычислить сторону основанія пирамиды и ея боковое ребро.

### Кишиневская 2-ая.

1) *Алгебра:* Купецъ пустилъ въ оборотъ нѣкоторую сумму денегъ,  
а черезъ годъ получилъ прибыли 900 руб.; прибыль эту вмѣстѣ съ  
первоначальнымъ капиталомъ онъ опять пустилъ въ оборотъ и черезъ  
годъ имѣлъ столько же процентовъ барыша, сколько и въ первый разъ.  
Въ концѣ второго года оказалось, что сумма, пущенная въ оборотъ въ  
началѣ первого года, относилась ко всей прибыли какъ 4:5. Составив-  
шуюся въ концѣ второго года сумму денегъ купецъ положилъ въ банкъ  
на 8 лѣтъ, прибавляя въ послѣднія пять лѣтъ въ началѣ каждого го-  
да по 485 руб. Какой образуется у купца капиталъ, если банкъ пла-  
тилъ по  $4,5\%$ , считан сложные проценты?

2) *Геометрія:* Сумма апоемои правильной шестиугольной пирами-  
ды и апоемои основанія =  $n$ , а каждый изъ плоскихъ угловъ при вер-  
шинѣ пирамиды =  $a$ . Вычислить боковую поверхность этой пирамиды,  
полагая  $n = 12,345$  ф. а  $a = 40^{\circ}27'18''$ .

### Маріупольская.

1) *Алгебра:* Сколько лѣтъ находился въ оборотѣ капиталъ 9689  
руб., если онъ обратился въ 14236, 33 руб., будучи отданъ по стольку  
сложныхъ процентовъ въ годъ, сколько членовъ въ ариѳметической про-

грессии, первый членъ которой  $a = \frac{x-1}{x+1}$ , сумма  $S = 20\left(\frac{1-x}{1+x}\right)$ , а отношение суммы четвертаго и тринацдцатаго членовъ къ суммѣ второго и десятаго—какъ 13 къ 8.

2) *Геометрія:* Радиусъ круга, вписанного въ треугольникъ,  $R = 12,6$ ; углы этого треугольника  $A = 52^\circ 47' 20''$  и  $B = 61^\circ 35' 30''$ ; опредѣлить объемъ тѣла, происшедшаго отъ вращенія этого треугольника около стороны АВ.

## ЗАДАЧИ.

**№ 120.** Нѣкто имѣеть въ настоящемъ 1894 году столько лѣтъ отъ роду, сколько единицъ въ числѣ, составленномъ двумя послѣдними цифрами того года, когда онъ родился. Сколько ему лѣтъ?

*П. Бахметьевъ (Софія).*

**№ 121.** Доказать, что

$$\sin x = x - 4\left(\sin^3 \frac{x}{3} + 3\sin^3 \frac{x}{3^2} + 3^2 \sin^3 \frac{x}{3^3} + \dots\right).$$

*А. Варениковъ (Рост. н. Д.).*

**№ 122.** Показать, что

$$\frac{r_a - r}{4R - r_a + r} = \frac{r \cdot r_a}{r_b r_c},$$

гдѣ  $R$  и  $r$  суть соотвѣтственно радиусы описанного и внутри-вписанного въ треугольникъ круговъ, а  $r_a, r_b, r_c$  — радиусы трехъ внѣ-вписанныхъ круговъ.

*Э. Заторскій (Могилевъ).*

**№ 123.** Вычислить площадь треугольника по двумъ даннымъ сторонамъ  $AC = b$  и  $BC = a$ , зная, что диаметръ описанной окружности, проведенный черезъ С, параллеленъ третьей сторонѣ.

*Н. Николаевъ (Пенза).*

**№ 124.** По данной длины  $a$  ребра ромбического додекаэдра опредѣлить его полную поверхность. Показать, что каждый изъ двуграныхъ угловъ ромбического додекаэдра содержитъ  $120^\circ$ .

*П. Свѣшниковъ (Троицкъ).*

**№ 125.** Въ параллелограммѣ  $ABCD$  сторона  $BC = 2AB$ . Изъ вершины его  $C$  опущенъ перпендикуляръ  $CE$  на сторону  $AB$  и точка  $E$  соединена съ серединою  $M$  стороны  $AD$ . Показать, что уголъ  $DME$  втрое больше угла  $AEM$ .

(Заемств.) *В. Г. (Одесса).*

## Рѣшенія задачъ.

**№ 4** (3 сер.). Вершины даннаго треугольника  $ABC$  лежать на сторонахъ треугольника  $MNP$ , причемъ  $PN \perp AB$  въ точкѣ  $A$ ,  $MP \perp BC$  въ точкѣ  $B$  и  $MN \perp CA$  въ точкѣ  $C$ . По даннымъ сторонамъ треугольника  $ABC$  вычислить безъ помощи тригонометріи стороны и площадь треугольника  $MNP$ .

Опустивъ изъ точки  $B$  перпендикуляръ  $BE$  на сторону  $AC$  и замѣтивъ, что треугольникъ  $MBC$  подобенъ треугольнику  $CBE$ , ибо  $\angle M = \angle C$ , и треугольникъ  $ACN$  подобенъ треугольнику  $ABE$ , ибо  $\angle N = \angle A$ , найдемъ

$$\frac{MC}{BC} = \frac{BC}{BE} \text{ и } \frac{CN}{AC} = \frac{AE}{BE}, \text{ откуда } MC = \frac{\overline{BC}^2}{BE}, CN = \frac{AC \cdot AE}{BC}$$

и

$$MC + CN = MN = \frac{\overline{BC}^2 + AC \cdot AE}{BE}.$$

Такъ какъ

$$BC = a, BE = \frac{2\Delta}{b} \text{ и } AE = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2b},$$

гдѣ  $a, b, c$  суть стороны треугольника  $ABC$ , а  $\Delta$  его площадь, то

$$MN = \frac{(a^2 + b^2 + c^2)b}{4\Delta}.$$

Такъ какъ треугольникъ  $ABC$  подобенъ треугольнику  $MNP$ , то

$$\frac{MN}{b} = \frac{NP}{c} = \frac{MP}{a},$$

а потому

$$MP = \frac{(a^2 + b^2 + c^2)a}{4\Delta}, NP = \frac{(a^2 + b^2 + c^2)c}{4\Delta}$$

и площадь  $MNP = \frac{(a^2 + b^2 + c^2)^2}{16\Delta}$ .

*M. Семиховъ* (Полтава); *С. Копровскій* (с. Дятковичи); *Я. Бломбергъ* (Рига); *A. Варениовъ* (Шуя); *М. Прясловъ* (Ревель); *Г. Сивчинскій* (Варшава); *П. Хлебниковъ* (Тула); *К. и О.* (Тамбовъ); *П. Ивановъ* (Одесса); *Е. Щиолеевъ* (Курскъ).

*NB.* Тригонометрическое рѣшеніе получено отъ *Е. Зновицкаю* (Кievъ).

**№ 7** (3 сер.). Вдова должна раздѣлить оставшееся послѣ мужа наслѣдство въ 35000 рублей съ имѣющимъ родиться у нея ребенкомъ. Если это будетъ сынъ, то она получитъ вдвое меныше сына, если дочь—то вдвое больше дочери. У нея рождаются близнецы—сынъ и дочь. Какъ раздѣлить наслѣдство?

Строгій отвѣтъ на задачу:—данныхъ недостаточно для рѣшенія, ибо весьма возможно, что если бы завѣщатель предвидѣлъ рожденіе

близнецовыхъ, то онъ распорядился бы со своимъ капиталомъ иначе. Если же допустить, какъ это сдѣлали всѣ, приславшіе рѣшеніе задачи, что завѣщаніе и вѣ этомъ случаѣ сохраняетъ свою силу, то легко найдемъ отвѣтъ: сыну 20000 р., матери 10000 р., дочери 5000 р.

*A. Иванющкій, B. Поповичъ, B. Дзѣпчуковскій, C. Косилюшко* (ученики I кл. Винницкаго р. уч.); *K. Зловинскій, I. Харламовъ, H. Шебалинъ* (Кievъ); *K. Щиголевъ, B. Власовъ, B. Александровъ* (Курскъ); *I. Черноморцевъ, Ю. Идельсонъ* (Винница); *Ст. Окуличъ, Г. Сивчинскій* (Варшава); *A. Варенцовъ* (Ростов. н. Д.); *Я. Тепляковъ* (Радомысьль); *C. Адамовичъ* (с. Спасское); *A. Камышанскій* (Богодуховъ); *B. Лобачъ-Жученко* (Саратовъ); *C. Д-чевъ* (Москва); *O. Ривошъ* (Вильна); *H. Блоховъ* (с. Знаменка); *P. Ивановъ* (Одесса); *H. Рынинъ* (Симбирскъ); *H. C. (Тифлісъ)*; *K. и Ф. Тамбовъ*; *L. Беркманъ* (Бѣлостокъ); *P. Хлыбниковъ* (Тула); *M. Селиховъ* (Полтава).

**№ 41** (3 сер.). Рѣшить систему:

$$\begin{aligned} xy &= (a - b)(x - y), \\ ab(x + y)^2 &= (a^2 - b^2)(bx - ay). \end{aligned}$$

Умноживъ второе уравненіе на  $x - y$  и замѣнивъ во второй части полученнаго уравненія  $(a - b)(x - y)$  черезъ  $xy$ , получимъ:

$$ab(x + y)^2(x - y) = xy(a + b)(bx - ay).$$

Открывъ скобки, получимъ:

$$abx^3 - aby^3 + a^2xy^2 - b^2x^2y = (bx^2 + ay^2)(ax - by) = 0,$$

откуда

$$x = \frac{by}{a} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \quad (1)$$

$$x = \frac{y}{b} \sqrt{-ab} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \quad (2).$$

Подставивъ выраженіе (1) для  $x$  вѣ первое изъ данныхъ ур., найдемъ:

$$by^2 = (a - b)(by - ay),$$

откуда

$$y_1 = 0, \quad y_2 = -\frac{(a - b)^2}{b};$$

тогда

$$x_1 = 0, \quad x_2 = -\frac{(a - b)^2}{a}.$$

Подставивъ выраженіе (2) для  $x$  вѣ первое уравненіе, найдемъ

$$y^2 \sqrt{-ab} = (a - b)(y \sqrt{-ab} - by),$$

откуда

$$y_3 = 0, \quad y_4 = \frac{(a - b)(\sqrt{-a} - \sqrt{b})}{\sqrt{-a}};$$

тогда

$$x_3 = 0, \quad x_4 = \frac{(a - b)(\sqrt{-a} - \sqrt{b})}{\sqrt{b}}.$$

*G. Сивчинскій* (Варшава); *H. Радашевичъ* (Выборгъ); *A. Варенцовъ* (Ростовъ н. Д.).

**№ 268** (2 сер.). Показать, что если между цифрами цѣлого числа  $A$  нѣтъ ни одной, дѣляющейся на 3 безъ остатка, и если сумма цифръ числа  $A$ , будучи четной, остается неизмѣнной при умноженіи  $A$  на 2, на 3 и на 5, то изъ цифръ числа  $A$  можно составить число, кратное 99-ти.

Положимъ, что въ число  $A$  цифры 1, 2, 4, 5, 7, 8 входятъ соотвѣтственно  $m_1, m_2, m_4, m_5, m_7, m_8$  разъ. Сумма цифръ числа  $A$  будетъ равна

$$m_1 + 2m_2 + 4m_4 + 5m_5 + 7m_7 + 8m_8 \quad (1)$$

При умноженіи  $A$  на 2 цифра 1 числа  $A$  дастъ двѣ единицы въ суммѣ цифръ числа  $2A$ , цифра 2 даетъ 4 единицы и т. д. до цифры 8, которая даетъ 7 единицъ, ибо  $8 \cdot 2 = 16$ , а  $1 + 6 = 7$ . Такимъ образомъ найдемъ, что суммы цифръ чиселъ  $2A, 3A, 5A$  соотвѣтственно выражаются суммами:

$$\begin{aligned} & 2m_1 + 4m_2 + 8m_4 + m_5 + 5m_7 + 8m_8, \\ & 3m_1 + 6m_2 + 3m_4 + 6m_5 + 3m_7 + 6m_8, \\ & 5m_1 + m_2 + 2m_4 + 7m_5 + 8m_7 + 4m_8. \end{aligned}$$

Приравнивая каждое изъ этихъ выражений выраженню (1), получимъ:

$$\begin{aligned} & (m_1 - m_8) + 2(m_2 - m_7) + 4(m_4 - m_5) = 0; \\ & 2(m_1 - m_8) + 4(m_2 - m_7) + 2(m_4 - m_5) = 0; \\ & 4(m_1 - m_8) - (m_2 - m_7) - 2(m_4 - m_5) = 0; \end{aligned}$$

откуда

$$m_1 - m_8 = m_2 - m_7 = m_4 - m_5 = 0$$

следовательно въ числѣ  $A$  каждая цифра 1, 2, 4 встрѣчается столько же разъ, сколько разъ встрѣчается цифра, дополняющая ее до 9. Пусть  $n$  будетъ число паръ цифръ, входящихъ въ  $A$ . Можно положить, по доказанному, что сумма цифръ, составляющихъ пару, равна 9-ти. Сумма цифръ числа  $A$  будетъ равна  $9n$ , а такъ какъ, по условію, эта сумма четная, то  $n = 2n_1$ , гдѣ  $n_1$  цѣлое, следовательно  $A$  содержитъ четное число паръ цифръ. Разобъемъ всѣ цифры числа  $A$  на двѣ группы, изъ коихъ каждая содержитъ одинаковое число  $n_1$  паръ. Сумма цифръ каждой группы можетъ быть сдѣлана равной  $9n_1$ . Составимъ число  $B$  такъ, чтобы цифры одной группы занимали четные, а цифры другой — нечетные мѣста. Число  $B$  будетъ кратнымъ чиселъ 9 и 11 ибо сумма цифръ  $B$  равна  $9.2n_1$ , а сумма цифръ четныхъ мѣстъ равна суммѣ цифръ нечетныхъ.

N.B. Ни одного удовлетворительного рѣшенія. Напечатанное рѣшеніе принадлежитъ автору задачи, г. С. Шатуновскому.

**ПОЛУЧЕНЫ РѢШЕНИЯ ЗАДАЧЪ** отъ слѣдующихъ лицъ: **П. Бѣловъ** (с. Знаменка) 106, 107 (3 сер.), 463 (2 сер.); **Я. Полушкина** (с. Знаменка) 64, 98, 99, 103, 105 (3 сер.), 10 (Мал. вопр.), 578 (2 сер.); **Жихарева** (Воронежъ) 68, 85 (3 сер.); **ученика Кіево-Печерск. іуми.** 49, 74, 75, 92 (3 сер.); **А. Бачинскаго** (Холмъ) 85, 92, 98, 99 (3 сер.); **И. Барковскаго** (Могилевъ) 56, 81, 82, 83, 85, 92 (3 сер.); **Н. Андрикевича** (Очаковъ) 89, 104 (3 сер.), 10 (Мал. Вопр.); **Э. Заторскаго** (Могилевъ н. Д.) 420, 430, 431 (2 сер.), 81, 82, 83, 85, 86 (3 сер.); **А. Вареникова** (Рост. на Дону) 92, 100, 103, 105, 106, 107 (3 сер.); **Д. Татаринова** (Троицкъ) 95 (3 сер.); **Б. Гуминскаго** (Троицкъ) 96, 98 (сер.); **И. Никольскаго** (Очаковъ) 89, 104 (3 сер.), 10 (Мал. Вопр.); **В. Кузнецовскаго** (Кіевъ) 10 (Мал. Вопр.); **П. Хльниковаго** (Тула) 25, 52, 89, 102 (3 сер.); **К. Зновицкаго** (Кіевъ) 82 (3 сер.), 10 (Мал. Вопр.); **П. Иванова** (Одесса) 9, 69, 72, 77, 81, 82, 83, 85, 92, 93 (3 сер.), 408 (2 сер.).

Редакторъ-Издатель Э. К. Шпачинскій.

Дозволено цензурою. Одесса, 5-го Декабря 1894 г.

„Центральная типо-литографія“, уг. Авчинникова пер. и Почтовой ул., д. Болгарова.

# БИБЛІОГРАФІЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ

## НОВІЙШИХЪ НѢМЕЦКИХЪ ИЗДАНІЙ.

### М а т е м а т и к а .

*Bardey*, Dr. *Ernst*. Algebraische Gleichungen, nebst den Resultaten und den Methoden zu ihrer Auflösung. 4. Aufl. gr. 8<sup>0</sup>. (XI+378 S.) L., B. G. Teubner. M. 6,00.

*Frege*, Prof., Dr. *G.* Grundgesetze der Arithmetik. Begriffsschriftlich abgeleitet. 1. Bd. gr. 8<sup>0</sup>. (XXXII+253 S.) Jena. H. Pohle. M. 12,00.

*Gravelius*, D. *Harry*. Lehrbuch der höheren Analysis. Zum Gebrauche bei Vorlesungen an Universitäten und techn. Hochschulen. I. Bd.: Lehrbuch der Differentialrechnung. gr. 8<sup>0</sup>. (VII+323 S.) B., F. Dümmeler's Verl. M. 6,00.

Jahresbericht der deutschen Mathematiker-Vereinigung. 2. Bd. 1891—1892. Hrsg. v. G. Cantor, W. Dyck, E. Lampe. gr. 8<sup>0</sup>. B., G. Reimer. M. 4,50.

*Obenrauch*, Prof. *Ferd. Jos.* Monge, der Begründer der darstellenden Geometrie als Wissenschaft. Eine mathematisch-histor. Studie. Progr. gr. 8<sup>0</sup>. (33 S.) Brünn, Prof. F. J. Obenrauch's Selbstverl. M. 2,00.

*Dedekind*, Rich. Prof. Was sind und was sollen die Zahlen. 2. Aufl. gr. 8<sup>0</sup> (XIX+58 S.). Braunschweig. F. Vieweg & Sohn: M. 1,60.

*Delin*, Carl, Dr. Ueber zwei ebene Punktsysteme, die algebraisch auf einander bezogen sind. Diss. gr. 8<sup>0</sup>. (85 S. mit 1 Tab.). Lund, Hj. Möller's Univ.-Buchh. M. 1,60.

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik, begründet v. Carl Ohrtmann, hrsg. v. Emil Lampe. 22. Bd. Jahrg. 1890. 3. Hft. gr. 8<sup>0</sup> (LXVIII u. S. 849—1313). Berlin. G. Reimer. M. 13,00.

*Jordan*, W., Prof. Logarithmisch-trigonometrische Tafeln für neue (centesimale) Teilung mit 6 Decimalstellen. Lex. 8<sup>0</sup> (VIII+420 S.) Stuttgart. K. Wittwer's Verl. M. 10.

*Röhn*, Karl, u. *Erwin Papperitz*, Proff. DD. Lehrbuch der darstellenden Geometrie. In 2 Bdn. I. Bd. gr. 8<sup>0</sup>. (XVIII+381 S. m. Fig.). Leipzig. Veit & Co. M. 11,00.

*Bergbohm*, Jul., Dr. Entwurf e. neuen Integralrechnung auf Grund der Potenzial-, Logarithmal- und Numeralrechnung. 2. Hft. gr. 8<sup>0</sup>. Leipzig. B. G. Teubner. M. 2,00.

*Dölp*, H., weil. Prof. Die Determinanten, nebst Anwendung auf die Lösung algebraischer und analitisch-geometrischer Aufgaben. Elementar behandelt. 4. Aufl. gr. 8<sup>0</sup>. (IV+95 S.) Darmstadt. L. Brill. M. 2,00.

$$\text{Kämpfe, Bruno. Tafel des Integrals } \Phi(\gamma) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\gamma e^{-t^2} dt. \text{ gr. 8}^0 \text{ (4 S.)}. \text{ Leipzig.}$$

W. Engelmann. M. 0,60.

*Killing*, Wilh., Prof., Dir. Einführung in die Grundlagen der Geometrie. 1. Bd. gr. 8<sup>0</sup> (X+357 S. m. 40 Fig.). Paderborn. F. Schöningh. M. 7,00.

Repetitorium, kurzes, der höheren Mathematik. I. Thl.: Differentialrechnung. 8<sup>0</sup> (81 S. m. Fig.) Wien. M. Breitenstein. M. 1,10.

*Study*, E. Sphärische Trigonometrie, orthogonale Substitutionen und elliptische Functionen. Eine analytisch-geometrische Untersuchung. Lex.-8<sup>0</sup> (148 S. m. 16 Fig.) Leipzig. S. Hirzel. M. 5,00.

*Thomae*, Joh. Die Kegelschnitte in rein projectiver Behandlung. gr. 8<sup>0</sup> (VIII+181 S. m. Holzschn. u. 16 lith. Taf.) Halle L. Nebert. M. 6,00.

*Goursat*, E. Vorlesungen über die Integration der partiellen Differentialgleichungen 1. Ordnung. Bearb. von C. Bourlet. Autoris. deutsche Ausg. von H. Moser. Mit einem Begleitwort von S. Lie. gr. 8<sup>0</sup>. (XII+416). Leipzig. B. G. Teubner. M. 10,00.

*Lie*, Sophus, Prof. Theorie der Transformationsgruppen. 3. und. letzter Abschnitt. Unter Mitwirkung von Prof. Dr. Frdr. Engel bearb. gr. 8<sup>0</sup> (XXVII+830). Leipzig. B. G. Teubner. M. 26,00 (kpl. M. 60,00).

*Lie*, Sophus, Prof. Vorlesungen über continuierliche Gruppen mit geometrischen und anderen Anwendungen. Bearb. u. hrsg. v. Privatdoc. Dr. Geo. Scheffers. gr. 8<sup>0</sup> (XII+810 m. Fig.). Leipzig. B. G. Teubner. M. 24,00.

*Müller*, E. R. Lehrbuch der planimetrischen Konstruktionsaufgaben, gelöst durch geometrische Analysis. 2. Tl. Verwandlungs- und Teilungsaufgaben, sowie Aufgaben über ein- und umbeschriebene Figuren. Bearb. nach System Kleyer. gr. 8<sup>0</sup> (V+86 m. 54 Fig.) Stuttgart. J. Maier. M. 2,00.

# КАТАЛОГЪ ИЗДАНИЙ

## РЕДАКЦИИ

### „ВѢСТНИКА ОПЫТНОЙ ФИЗИКИ И ЭЛЕМЕНТАРНОЙ МАТЕМАТИКИ“.

**№ кат.**

**Цѣна съ перес.**

0. Электрическіе аккумуляторы Э. К. Шпачинской . . . . .	— руб. 55 коп.
9. О землетрясеніяхъ Э. К. Шпачинской . . . . .	— " 50 "
16. О формулѣ $P=MG$ . Пр. О. Хевольсона . . . . .	— " 50 "
17. Объ обратныхъ изображеніяхъ на сѣтчатой оболочкѣ глаза О. Страуса . . . . .	— " 5 "
18. Элементарная теорія гироскоповъ. Пр. Н. Жуковской . . . . .	— " 20 "
24. Абсолютная скала температуръ. Пр. Н. Шиллера . . . . .	— " 25 "
28. Методы рѣшеній ариѳметическихъ задачъ И. Александрова. Изда- ніе 3-е . . . . .	— " 35 "
31. Ариѳметическая начала гармонизаціи. В. Фабрициуса . . . . .	— " 5 "
34. О гальванопластикѣ. Н. Успенской . . . . .	— " 10 "
36. Среднія величины: ариѳметическая, геометрическая и гармониче- ская. И. Клейбера . . . . .	— " 25 "
37. Именованыя величины въ школьномъ преподаваніи. Ф. Мацона . . . . .	— " 85 "
39. О газообразномъ и жидкокомъ состояніи тѣлъ. Князя Б. Голицына 1	" 10 "
40. Взаимныя точки треугольника. А. Грузинцева . . . . .	— " 20 "
41. Нѣсколько опытовъ изъ гидростатики и гидродинамики. Пр. Н. Слутикова . . . . .	— " 5 "
42. Замѣтка о центробѣжной силѣ. Пр. Н. Шиллера . . . . .	— " 15 "
43. Объ отношеніи окружности къ диаметру. М. Попруженко . . . . .	— " 10 "
44. Проективные ряды съ общимъ основаніемъ. Д. Ефремова . . . . .	— " 10 "
46. Значеніе геометрическихъ построеній въ тригонометріи. И. Алек- сандро娃 . . . . .	— " 10 "
47. Практическое руководство къ изготавленію электрическихъ прибо- ровъ (для любителей) Р. Боттона. Переводъ П. Прокшина. Издание 2-е . . . . .	1 " 50 "
49. Внутренняя точка геометрической фигуры. И. Клейбера . . . . .	— " 15 "
50. Краткій исторический очеркъ развитія ученія объ электричествѣ. О. Пергамента . . . . .	— " 70 "
51. Общее рѣшеніе въ цѣлыхъ числахъ неопределенныхъ уравненій 1-й степени. Д. Ефремова . . . . .	— " 10 "
52. Роль машины Атвуда въ воображаемомъ доказательствѣ 2-го за- кона Ньютона. Проф. Н. Шиллера . . . . .	— " 5 "
53. О начальномъ преподаваніи алгебры. Пр. В. Ермакова . . . . .	— " 5 "
54. Наибольшія и наименьшія значенія квадратной дроби. Н. Флорова . . . . .	— " 5 "
55. О суммѣ цыфръ при различныхъ системахъ счисленія. Н. Сорокина . . . . .	— " 5 "
58. Таблицы 4-значныхъ логарифмовъ и антилогарифмовъ на двухъ складныхъ карточныхъ страницахъ . . . . .	— " 32 "
59. О разложеніи многочленовъ на множителіи. М. Попруженко . . . . .	— " 25 "
60. Новый способъ извлечения корней. И. Клейбера . . . . .	— " 12 "
62. О длии. М. Попруженко . . . . .	— " 20 "
63. Къ 100-лѣтней годовщинѣ рожденія М. Фарадея. О. Пергамента . . . . .	— " 20 "
64. Hermann von Helmholtz. Пр. Г. Де-Метица . . . . .	— " 20 "
65. Объ одномъ лекціонномъ электрометрѣ. Пр. Ф. Шведова . . . . .	— " 5 "
66. О наибольшихъ произведеніяхъ и наименьшихъ суммахъ. П. Флорова . . . . .	— " 12 "
№№ 4, 8, 15, 22, 29, 35, 38, 48, 57, 61, 67, 75, 83, 92, 96 соотвѣт- ствуютъ сброшюрованнымъ комплектамъ „Вѣстника“ за I—XVI семестры и продаются по . . . . .	2 " 50 "

# ОБЗОРЪ НАУЧНЫХЪ ЖУРНАЛОВЪ.

## JOURNAL

de mathématiques élémentaires.


1894.—№ 6.

Note sur le dodécaèdre et l'icosaèdre réguliers convexes. Par M. Joseph Cernesson.

I. Додекаэдръ. Если  $a_5$  и  $a'_5$  суть стороны правильныхъ 5-тиугольниковъ выпуклого и звѣздчатаго,  $a_{10}$  и  $a'_{10}$  — стороны правильныхъ 10-тиугольниковъ выпуклого и звѣздчатаго,  $R$  — радиусъ описанного около нихъ круга, то, какъ извѣстно,

$$a_5^2 - a_{10}^2 = R^2, a'_5^2 - a'^2_{10} = R^2 \quad (1)$$

Изъ вершины А правильнаго вписаннаго 5-тиугольника (фиг. 41) опустимъ перпендикуляръ AI на продолжение его стороны BC и обозначимъ пересѣченіе его съ окружностью черезъ  $a$ ; тогда



Фиг. 41.

$$IB^2 = AB^2 - AI^2 = aB^2 - aI^2,$$

$$BF^2 = EB^2 - EF^2 = OB^2 - OF^2;$$

отсюда

$$AI^2 - aI^2 = AB^2 - aB^2 \text{ и}$$

$$EF^2 - OF^2 = EB^2 - OB^2;$$

такъ какъ  $AB = a_5$ ,  $aB = a_{10}$ ,  $BE = a'_5$ ,  $OB = R$ , то на основаніи равенства (1) получимъ:

$$AI^2 - aI^2 = R^2, EB^2 - OB^2 = a'^2_{10}. \quad (2)$$

Пусть фиг. 42 представляетъ горизонтальную и вертикальную проекціи правильнаго додекаэдра. Изъ равенствъ (2) легко вывести, что  $mn = qr = \omega a$ ,  $\omega p = po$ ,  $nq = ab$ . Равенства эти даютъ возможность построить проекціи правильнаго додекаэдра безъ совмѣщенія его граней съ горизонтальной плоскостью проекцій. Пользуясь тѣми-же свойствами проекцій додекаэдра, легко выразить ребро его  $a$  черезъ радиусъ  $\varrho$  описаннаго около него шара. Положивъ  $\omega a = r$ ,  $\omega a' = d$ , получимъ

$$\varrho^2 = d^2 + r^2, \quad d = \frac{mn + mq}{2};$$

такъ таکъ  $mn = r$ ,  $mq = r \frac{\sqrt{5} + 1}{2}$ , то  $d = r \frac{3 + \sqrt{5}}{4}$ ;

следовательно


$$\varrho^2 = \frac{3r^2(5 + \sqrt{5})}{8};$$

но

$$a^2 = \frac{r^2(5 - \sqrt{5})}{2};$$

исключивъ  $r$  изъ этихъ равенствъ, получимъ

$$a = \varrho \frac{\sqrt{5} - 1}{\sqrt{3}}.$$



Фиг. 42.

**Sur la théorie des amortissements et des annuités.** Par M. Aubry. Въ задачахъ на сложные проценты и срочные уплаты определение процентовъ приводится къ решению ур-ний вида

$$Ax^n + Bx + C = 0 \quad (1)$$

и

$$Ax^n + Bx^{n-1} + C = 0,$$

причёмъ второе изъ этихъ ур-ний приводится къ виду (1) черезъ подстановку  $\chi = \frac{1}{x}$ . M. Aubry замѣчаетъ, что рѣшеніе ур-ния (1) по приближенію, на основаніи неравенства

$$ma^{m-1} > \frac{a^m - b^m}{a - b} > mb^{m-1},$$

по указанному имъ способу (См. Вѣстн. № 173, обзоръ J. E.) можно было бы ввести въ элементарные учебники алгебры.

**Exercices divers.** Par M. Boutin (Suite). №№ 323 — 326.

323. Найти треугольные числа, которые суть полные квадраты.

Рѣш. Задача приводится къ решению въ цѣлыхъ числахъ ур-ний

$$2x^2 + 1 = k^2, \quad (1)$$

$$2x^2 - 1 = k'^2. \quad (2)$$

Положивъ  $\alpha_0 = 0$ ,  $\alpha_1 = 1$ ,  $\alpha_2 = 2$ , и составивъ рядъ чиселъ по формулѣ

$$\alpha_n = 2\alpha_{n-1} + \alpha_{n-2},$$

получимъ:

$$x = \alpha_{2n}, \quad k = \alpha_{2n} + \alpha_{2n-1}, \quad (1)$$

$$x = \alpha_{2n+1}, \quad k' = \alpha_{2n+1} + \alpha_{2n}. \quad (2)$$

324. Сумма двухъ последовательныхъ треугольныхъ чиселъ есть полный квадратъ.

325. Рѣшить въ цѣлыхъ числахъ ур-ніе

$$3x^2 + 1 = y^2.$$

Рѣш.

$$x_n = 4x_{n-1} - x_{n-2},$$

$$y_n = 4y_{n-1} - y_{n-2},$$

при чёмъ

$$x_0 = 0, \quad x_1 = 1, \quad y_0 = 1, \quad y_1 = 2.$$

326. Рѣшить въ цѣлыхъ числахъ ур-ніе:

$$5x^2 + 1 = k^2, \quad (1)$$

$$5x^2 - 1 = k'^2. \quad (2)$$

Рѣш.

$$x = \alpha_{2n}, \quad k = \beta_{2n}, \quad (1)$$

$$x = \alpha_{2n+1}, \quad k' = \beta_{2n+1}, \quad (2)$$

гдѣ

$$\alpha_n = 4\alpha_{n-1} + \alpha_{n-2}, \quad \beta_n = 4\beta_{n-1} + \beta_{n-2}$$

и

$$\alpha_0 = 0, \quad \alpha_1 = 1; \quad \beta_0 = 1, \quad \beta_1 = 2.$$

**Correspondance.** Извлечение изъ письма Bernes'a по поводу построения касательной къ эллипсу.

**Bibliographie.** Les femmes dans la science. Par A. Réville. (Librairie Nony, prix 1 fr. 50 c.).

**Baccalauréats.**

**Questions (résolues).** №№ 510, 512, 514, 520, 522, 523, 527.

**Questions proposées.** №№ 554 — 561.

Д. Е.

Обложка  
ищется

Обложка  
ищется